

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA**QUESTÃO 21**

São causas de queimadura pela aplicação da iontoforese, **EXCETO**:

- a) Uso de corrente contínua.
- b) Intensidade muito alta.
- c) Polaridade errada.
- d) Eletrodos muito pequenos e secos.

QUESTÃO 22

É característica da instabilidade do ombro do tipo AMBRI, **EXCETO**:

- a) Causa atraumática.
- b) Instabilidade multidirecional.
- c) Evidência de Lesão de Bankart.
- d) Reabilitação como tratamento apropriado e raramente cirurgia.

QUESTÃO 23

Nível de amputação supramaleolar com reposição do coxim subcalcâneo na base da amputação:

- a) Pirogoff.
- b) Lisfranc.
- c) Syme.
- d) Choppart.

QUESTÃO 24

Aos dez meses de idade, uma criança nascida a termo e sem atraso no desenvolvimento motor, deve apresentar os seguintes reflexos, **EXCETO**:

- a) Reflexo plantar de apreensão.
- b) Reflexo de Moro.
- c) Reflexo postural labiríntico.
- d) Reação de Landau.

QUESTÃO 25

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), é **CORRETO** afirmar:

- a) Todas as pessoas que apresentam problemas de desempenho e limitações de capacidade possuem deficiências evidentes.
- b) Atividade é um termo que define o envolvimento de uma pessoa em situações de vida diária.
- c) Participação é um termo que define a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo.
- d) Uma pessoa pode ter deficiências sem limitações de capacidade.

QUESTÃO 26

São achados passíveis de exame físico na síndrome do desfiladeiro torácico, **EXCETO**:

- a) Dor e sinal de Tinnel na fossa supraclavicular.
- b) Hipoestesia na região interescapular.
- c) Ausculta de sopro na região supraclavicular.
- d) Teste de Adson positivo.

QUESTÃO 27

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), é **INCORRETO** afirmar:

- a) A Classificação Internacional de Doenças (CID) não é complementar a CIF, uma vez que já fornece um diagnóstico de doenças, distúrbios ou outras condições de saúde.
- b) Como uma classificação, a CIF agrupa sistematicamente diferentes domínios de uma pessoa em uma determinada condição de saúde, ou seja, o que uma pessoa com uma doença ou transtorno faz ou pode fazer.
- c) Na CIF, a saúde e os estados relacionados à saúde de um indivíduo podem ser registrados através de códigos apropriados da categoria e do acréscimo de qualificadores.
- d) Na CIF, uma abordagem "biopsicossocial" é utilizada para se obter a integração das várias perspectivas de funcionalidade; assim, a CIF tenta chegar a uma síntese que ofereça uma visão coerente das diferentes dimensões de saúde sob uma perspectiva biológica, individual e social.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Na espirometria de distúrbio ventilatório restritivo, apenas o valor do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) encontra-se diminuído.
- b) A fraqueza dos músculos respiratórios pode ser avaliada pela mensuração da pressão inspiratória máxima (PImáx) e da pressão expiratória máxima (PEmáx).
- c) A oximetria de pulso é a medida invasiva da saturação da hemoglobina em oxigênio no sangue arterial.
- d) A medida do pico de fluxo expiratório (PFE) deve ser realizada a partir de uma inspiração máxima seguida de uma expiração lenta e prolongada.

QUESTÃO 29

Em relação à reabilitação pulmonar (RP) assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O programa de RP deve incluir, dentre vários componentes, a orientação do paciente e de seus familiares sobre a doença, o treinamento físico e o aconselhamento nutricional.
- b) Somente os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica são beneficiados por um programa de RP, já que são os pneumopatas com maior intolerância à atividade física e os que mais referem dispneia.
- c) A oxigenoterapia e o treinamento específico dos músculos respiratórios podem ou não ser incluídos em um programa de RP, dependendo da necessidade de cada paciente.
- d) São alguns dos objetivos de um programa de RP: diminuição da sensação de dispneia, aumento da tolerância ao exercício físico e melhora da qualidade de vida do paciente.

QUESTÃO 30

Marque a opção **INCORRETA**:

- a) Durante o movimento de flexão, o ligamento interespinhoso é colocado sob tensão.
- b) Durante o movimento de flexão, o núcleo pulposo tende a migrar posteriormente.
- c) Durante os movimentos combinados de flexão e rotação, há risco de ruptura das fibras posteriores do anel fibroso.
- d) Durante o movimento de extensão, o espaço do forame intervertebral é aumentado.

QUESTÃO 31

Medida terapêutica importante no tratamento de fase inicial pós-lesão em reabilitação esportiva:

- a) Protocolo PRICE.
- b) Exercícios isotônicos resistidos.
- c) Apoio precoce em lesões de membro inferior.
- d) Diatermia por ondas curtas.

QUESTÃO 32

São efeitos da fraqueza ou insuficiência do tibial anterior na marcha, **EXCETO**:

- a) Queda do pé durante o balanceio.
- b) Flexão excessiva do quadril e joelho durante o balanceio.
- c) Incapacidade de controlar o avanço anterior da tíbia.
- d) Batida do pé imediatamente após o contato inicial do calcanhar.

QUESTÃO 33

Quanto às respostas neuromusculares ao alongamento, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O reflexo de alongamento também conhecido como reflexo miotático é provocado pela inibição dos fusos em um músculo alongado.
- b) O limiar para estimulação dos órgãos tendinosos de Golgi (OTG) pelo alongamento é muito mais alto que a tensão produzida pela contração muscular.
- c) Um ritmo lento de alongamento não consegue ativar a resposta dos fusos musculares.
- d) Os objetivos gerais de qualquer procedimento para alongamento muscular consistem em minimizar os efeitos do fuso e maximizar os do OTG.

QUESTÃO 34

Paciente amputado em nível transfemural, ativo, com bom controle de joelho em todas as circunstâncias, deverá preferencialmente usar joelhos protéticos do tipo:

- a) joelhos com controle por descarga de peso.
- b) joelhos livres.
- c) joelhos de fricção constante.
- d) joelhos com autobloqueio.

QUESTÃO 35

Manobra clínica que no exame postural identifica alteração na mobilidade da coluna lombar:

- a) Manobra de Thomas.
- b) Teste de Ober.
- c) Índice de Cobb.
- d) Índice de Schober.

QUESTÃO 36

São características da hemiplegia do adulto, **EXCETO**:

- a) Hipertonia predomina nos músculos antigravitacionais, resultando no padrão extensor da musculatura de membros superiores e inferiores.
- b) A paralisia na fase inicial é flácida, com diminuição ou abolição dos reflexos profundos.
- c) A espasticidade apresenta-se em geral por lesões corticais ou da cápsula interna.
- d) Em alguns pacientes, pode verificar-se um quadro misto de espasticidade e hipotonia.

QUESTÃO 37

Quanto à estimulação elétrica funcional (FES), é **INCORRETO** afirmar:

- a) Para utilização da FES não é necessário a integridade da unidade motora.
- b) Em situações em que o neurônio motor inferior está íntegro, a unidade motora poderá ser ativada com intensidades menores conforme é aumentada a duração do pulso.
- c) O pulso ideal deve ser bifásico, ou seja, possuir um componente positivo e outro negativo para proporcionar a repolarização da membrana muscular.
- d) O repouso R é o período entre dois tens de pulso em que não há estímulo elétrico.

QUESTÃO 38

Assinale a correspondência **INCORRETA**:

- a) Teste de Watson – Avaliar oclusão da artéria radial.
- b) Teste de Phalen – investigar neuropatia do nervo mediano.
- c) Teste de Froment – investigar paralisia do nervo ulnar.
- d) Teste de Filkenstein – diferenciar tenossinovite de Quervain de osteoartrite.

QUESTÃO 39

Nervo que, lesionado, causa elevação medial anormal da escápula:

- a) Torácico longo.
- b) Circunflexo.
- c) Acessório.
- d) Musculocutâneo.

QUESTÃO 40

São efeitos da crioterapia:

- I. Aumento temporário da espasticidade.
- II. Aumento da rigidez articular.
- III. Redução de atividade da colagenase sinovial.
- IV. Redução da extensibilidade dos tendões.

Estão **CORRETOS** os efeitos apontados em:

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas II, III e IV.
- c) apenas I, III e IV.
- d) I, II, III, IV.