



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Veríssimo e o Natal

Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



QUESTÃO 04

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

QUESTÃO 05

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

QUESTÃO 06

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

QUESTÃO 07

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

QUESTÃO 08

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

QUESTÃO 09

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

QUESTÃO 10

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

TEXTO II



QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

O sangramento uterino anormal é um dos principais motivos de procura por atendimento ginecológico. Sobre esta condição, assinale (V) para **Verdadeiro** ou (F) para **Falso**.

- () É considerado anormal ciclos menstruais regulares de 35 dias, com duração de 7 dias e com uma perda de volume sanguíneo de 60 mL .
- () O sangramento uterino é o principal sintoma do carcinoma uterino.
- () Sangue menstrual com coágulos, anemia e aumento da duração do ciclo menstrual, sugerem sangramento uterino anormal.
- () A presença de miomas exclui a origem disfuncional de um sangramento.
- () Apesar de ser bastante específica, a ultrassonografia transvaginal tem sensibilidade em torno de 50% na detecção de doença endometrial na pós-menopausa, tendo como corte a espessura de 5 mm.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) F, V, V, F, F.
- b) F, V, V, V, V.
- c) V, F, V, V, F.
- d) V, V, F, F, V.

QUESTÃO 17

Sobre o câncer genital feminino todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) O rastreamento de câncer de endométrio deve ser considerado em mulheres que apresentam fatores de risco, tais como, obesidade, menopausa tardia e história prévia de hiperplasia de endométrio.
- b) A presença de cistos ovarianos heterogêneos, com papilas nas paredes internas e septos com mais de 0,3 cm de espessura à ultrassonografia pélvica sugerem câncer ovariano, neoplasia que tem sua incidência aumentada com a idade e cujo rastreamento com marcadores tumorais não está recomendado na população geral.
- c) A infecção pelo HPV, o tabagismo e a má higiene são alguns dos fatores de risco para o câncer de vulva, quarta neoplasia mais comum do trato genital feminino no Brasil.
- d) A neoplasia trofoblástica gestacional é uma causa rara de câncer genital e tem alta sensibilidade à quimioterapia. O B-HCG é um marcador específico deste tumor.

QUESTÃO 18

A osteoporose tem se tornado um dos maiores problemas de saúde pública do mundo e está relacionada com o desenvolvimento econômico e o aumento da expectativa de vida. Em relação à osteoporose, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) A prevenção da osteoporose começa na infância e compreende hábitos de vida saudáveis que assegurem um alto pico de massa óssea na segunda década de vida.
- b) A maior parte da perda óssea ocorre durante os primeiros cinco anos pós-menopáusicos, indicando a reposição hormonal para todas as mulheres neste período.
- c) A densitometria óssea deve ser considerada nas mulheres com 65 anos de idade ou mais e naquelas na pós-menopausa com fatores de risco adicionais para osteoporose.
- d) A terapia de reposição hormonal, pelo efeito do estrogênio, é eficaz na redução do risco de fraturas da coluna vertebral e fêmur, em mulheres na pós-menopausa.

QUESTÃO 19

Paciente de 29 anos de idade com relato de corrimento vaginal amarelado e com odor fétido. Apresentou histórico de múltiplos parceiros no último ano, com coito desprotegido, mas negou doenças sexualmente transmissíveis no passado. Realizado exame especular que evidenciou corrimento vaginal amarelado moderado, com parede vaginal sem sinais inflamatórios. O colo uterino estava sem muco ou pus, íntegro e com teste de iodo negativo. Ao toque vaginal não foram observadas massas ou dor à manipulação do colo. Teste de pH, de aminas e microscopia não disponíveis. Considerando a abordagem síndrome das Doenças Sexualmente Transmissíveis, deve ser oferecido à paciente o seguinte tratamento:

- a) Penicilina G benzatina 1,4 milhões de unidades intramuscular e azitromicina 1 grama via oral em doses únicas.
- b) Ceftriaxona 250 mg intramuscular e azitromicina 1 grama via oral em doses únicas.
- c) Secnidazol 2 gramas via oral em dose única.
- d) Azitromicina 1 grama via oral em dose única; metronidazol 500 mg via oral de 12 em 12 horas por sete dias e fluconazol 150 mg em dose única.



QUESTÃO 20

Visando à interrupção na cadeia de transmissão e a prevenção da recorrência das Doenças sexualmente transmissíveis (DST), todas as condutas estão corretas após o diagnóstico de uma DST, **EXCETO**:

- Oferecer à paciente exames de anti-HIV, VDRL e sorologias para hepatites virais sexualmente transmissíveis.
- Encorajar a paciente a comunicar a todos os seus parceiros sexuais dos últimos seis meses, para que possam ser atendidos e tratados.
- Oferecer vacinação contra hepatite B.
- Oferecer preservativos à paciente, orientando sobre as técnicas de uso.

QUESTÃO 21

Os fatores de risco do câncer de colo uterino estão relacionados com a pobreza, desinformação e pouco acesso a controles periódicos, o que explica a alta frequência deste tumor nos países em desenvolvimento. Sobre o manejo das lesões no colo uterino, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- Lesões de baixo grau totalmente visíveis, que atingem menos de um quadrante do colo em pacientes com possibilidade de acompanhamento rigoroso podem ser acompanhadas de forma conservadora por dois anos.
- Não existem diferenças significativas entre as técnicas excisionais quanto à eficácia no tratamento das lesões intraepiteliais, qualquer que seja o grau.
- A conização com cirurgia de alta frequência está bem indicada para tratamento das lesões de alto grau; nos casos com diagnóstico cito-histológico discordante ou naqueles com extensão endocervical da lesão.
- A conização com bisturi frio está contraindicada para o tratamento do carcinoma microinvasor, independentemente do acometimento de espaços vasculares.

QUESTÃO 22

Sobre a histeroscopia, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- Nos casos de perfuração uterina durante a histeroscopia diagnóstica, uma laparotomia ou laparoscopia é necessária nas primeiras 3 horas.
- Dentre as complicações da histeroscopia diagnóstica, a embolia gasosa é a mais temida.
- A histeroscopia cirúrgica é o tratamento de eleição para exérese de pólipos endocervicais ou endometriais.
- As principais indicações da histeroscopia diagnóstica são o sangramento uterino anormal e a avaliação de pacientes inférteis.

QUESTÃO 23

Com relação à dor pélvica aguda, marque **(V)** para **Verdadeiro** e **(F)** para **Falso**.

- Ligadura tubária, endometriose e uso de dispositivo intrauterino são fatores de risco para gravidez ectópica.
- O tratamento da endometrite é sempre hospitalar.
- Os agentes etiológicos mais comuns da Doença inflamatória pélvica são a *Neisseria gonorrhoeae* e o *Ureaplasma urealyticum*.
- Pacientes com dispositivo intrauterino que apresentam doença inflamatória pélvica, devem ter o dispositivo retirado no final do tratamento.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- V, F, F, V.
- F, F, V, V.
- V, F, F, F.
- V, F, V, F.

QUESTÃO 24

A mamografia é o exame de eleição para o rastreamento do câncer de mama. Sobre o sistema de informação BI-RADS (*Breast Imaging Reporting and Data System*), todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- A categoria "0" sugere avaliação adicional de imagem, que pode ser por ultrassonografia ou outros métodos.
- As categorias 1 e 2 tem risco aproximado para câncer de zero e 2%, respectivamente.
- Na categoria 3 os achados são provavelmente benignos, mas recomenda-se uma avaliação mais precoce.
- Na categoria 5 o risco para câncer é maior ou igual a 90%.

QUESTÃO 25

Com relação ao manejo da Síndrome dos ovários policísticos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A combinação de ciproterona com etinil-estradiol acarreta a supressão do hiperandrogenismo com a melhora dos sintomas.
- A espironolactona na dose de 50 a 200mg/dia tem ação antiandrogênica, podendo ser utilizada na Síndrome dos ovários policísticos.
- A metformin melhora a resistência a insulina das portadoras da Síndrome dos ovários policísticos, mas não está associada com o aumento da ovulação.
- Nas pacientes que tem vida sexual ativa e que não desejam engravidar o uso de anticoncepcionais está indicado.



QUESTÃO 26

A detecção de fatores de risco que possam alterar o equilíbrio da gravidez é um dos principais objetivos do acompanhamento pré-natal. Com relação ao acompanhamento pré-natal, assinale a alternativa **CORRETA**:

- O exame de VDRL deve ser solicitado na primeira consulta e repetido no terceiro trimestre se negativo.
- O teste anti-HIV deve ser oferecido trimestralmente para pacientes que se enquadram em alguma situação de risco para Doenças sexualmente transmissíveis.
- O rastreamento de diabetes somente é realizado entre 24 e 28 semanas de gravidez.
- A ultrassonografia morfológica fetal está indicada entre 22 a 24 semanas de gestação por alterar a mortalidade materna e perinatal.

QUESTÃO 27

Com relação à hipertensão arterial na gravidez, analise as afirmativas:

- Hipertensão arterial que surge antes da vigésima quarta semana de gravidez ou que persiste além da sexta semana após o parto é classificada como hipertensão arterial crônica.
- Na síndrome de HELLP observa-se bilirrubinas $\geq 1,2$ mg/dL; desidrogenase láctica ≥ 600 U/L; transaminase glutâmico-oxalacética ≥ 70 U/L; plaquetas $< 100.000/mm^3$ e presença de hemácias fragmentadas no sangue periférico.
- A conduta na pré-eclâmpsia grave é: internação hospitalar; monitorização fetal; rastreamento de HELLP síndrome e insuficiência renal; correção da emergência hipertensiva; administração de sulfato de magnésio e interrupção da gestação após 48 horas de corticoterapia.

Marque a opção **CORRETA**:

- As afirmativas I, II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa II está correta.
- Apenas a afirmativa III está correta.

QUESTÃO 28

Sobre o uso de medicamentos na gravidez, associe as sequências:

SEQUÊNCIA 1

- Tetraciclina
- Anti-inflamatórios não-esteróides
- Anticonvulsivantes
- Diazepam
- Sulfonamidas

SEQUÊNCIA 2

- Use no terceiro trimestre pode levar à hipertensão pulmonar primária no recém-nascido pela constrição do ducto arterioso.
- Associado à depressão respiratória e síndrome de abstinência em neonatos.
- Use no segundo e terceiro trimestres pode causar uma coloração amarelo-escura nos dentes dos filhos das gestantes expostas.
- Use no período periparto pode causar icterícia e anemia hemolítica.
- Considerado teratogêno potencial, mas seu uso se justifica pelo risco da interrupção do tratamento.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- 3, 4, 5, 2, 1.
- 2, 4, 5, 1, 3.
- 2, 3, 5, 1, 4.
- 2, 4, 1, 5, 3.

QUESTÃO 29

Sobre a assistência ao trabalho de parto assinale **(V)** para Verdadeiro e **(F)** para Falso.

- O uso de critérios diagnósticos claros da fase ativa de trabalho de parto reduz o uso de ocitocina e analgesia.
- O uso de enema opaco não é recomendado de rotina porque não há evidências que sua prática reduz o risco de infecção materna ou fetal.
- A amniotomia reduz a duração do trabalho de parto e deve ser realizada uma hora após a admissão se não houver progressão da dilatação do colo de pelo menos 1 cm.
- A episiotomia deve ser realizada seletivamente e de preferência deve ser médio-lateral.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- V, V, V, V.
- F, V, V, F.
- V, F, F, V.
- F, V, F, V.

**QUESTÃO 30**

Para prevenção da transmissão vertical do Vírus da imunodeficiência humana (HIV) todas as condutas são adequadas, **EXCETO**:

- a) Indicar cesariana eletiva se a carga viral após a 34ª semana for \geq a 500 cópias/mL.
- b) Iniciar a terapia anti-retroviral tripla a partir da 14ª semana de gestação.
- c) Administrar Zidovudina intravenosa a todas as mães HIV positivas no momento do parto.
- d) Aconselhar as mães HIV positivas a não amamentarem seus filhos desde o nascimento.