



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Veríssimo e o Natal

Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



QUESTÃO 04

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

QUESTÃO 05

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

QUESTÃO 06

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

QUESTÃO 07

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

QUESTÃO 08

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

QUESTÃO 09

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

QUESTÃO 10

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

TEXTO II



QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

As *Enterobacteriaceae* são causas frequentes de infecções hospitalares. Nos últimos 10 anos, nota-se mundialmente um aumento do relato de cepas destas bactérias, apresentando resistência aos carbapenêmicos. Em relação à resistência ao carbapenêmicos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- Os carbapenêmicos são geralmente resistentes à ESBL (extended-spectrum beta-lactamase).
- As carbapenemases de classe A podem ser codificadas tanto por cromossomos quanto por plasmídeos.
- As metalo-beta-lactamases hidrolizam todos os beta-lactâmicos, com exceção do aztreonam.
- As metalo-beta-lactamases são parcialmente inibidas por clavulanato.

QUESTÃO 17

Mulher de 51 anos, diabética tipo 2, apresenta infecção de pele no pé direito. O quadro teve início agudo, após pequeno trauma na região, e a paciente encontra-se afebril. À inspeção, a celulite se estende por 1 cm da periferia da úlcera e a lesão não apresenta necrose, abscesso, nem sinais de acometimento profundo. Nega hospitalização ou uso de antimicrobiano recentemente. Em relação ao manejo da infecção desta paciente, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A cobertura antibiótica deve levar em consideração que *Streptococcus sp.* ou *Staphylococcus aureus* são os agentes geralmente responsáveis por este quadro.
- A cobertura antimicrobiana para anaeróbios, incluindo *Bacteroides fragilis*, é obrigatória.
- A cobertura contra *Pseudomonas*, utilizando-se quinolona, é obrigatória.
- A duração do tratamento deve ser de pelo menos seis semanas, pois a chance de acometimento ósseo, mesmo que inaparente ao exame físico, é elevada.

QUESTÃO 18

Paciente de 60 anos, assintomática, sem comorbidades, é referenciada ao infectologista devido à presença de bacteriúria, sem hematúria ou piúria, em exame de urina “de rotina”. Assinale a alternativa que apresenta a conduta **CORRETA** em relação ao uso apropriado de antimicrobiano nesta paciente:

- Deve-se iniciar prontamente tratamento empírico, pois este resulta em melhora clínica significativa e reduz a incidência de pielonefrite em pacientes de qualquer idade.

- Deve-se iniciar tratamento por 14 dias após urocultura e manter antibioticoterapia profilática por pelo menos 12 meses.
- A hipótese de tuberculose renal é a mais provável, devendo ser prontamente solicitado PPD e, caso positivo, iniciar tratamento com tuberculostáticos.
- Deve-se evitar o tratamento já que a paciente está assintomática, não apresenta comorbidades, e a recorrência da bacteriúria após tratamento é frequente.

QUESTÃO 19

Paciente de 28 anos, gestante, encaminhada para avaliação de sorologia para toxoplasmose positiva. G2P0A1, abortamento ocorrido dois anos antes, na 8ª semana de gestação, antes de iniciar o pré-natal naquela gestação. Atualmente na 14ª semana de gestação. Resultado de exames: Sorologia para toxoplasmose IgG positivo, IgM positivo, teste de avidéz para toxoplasmose mostrando índice de 0,485 (valores de referência do teste - abaixo de 0,200: baixa avidéz; entre 0,200 e 0,299: avidéz intermediária; igual ou superior a 0,300: alta avidéz). Assinale a alternativa que apresenta a conduta **CORRETA** para esta gestante em relação à toxoplasmose:

- Iniciar imediatamente sulfametoxazol/trimetoprim, pirimetamina e ácido fólico e solicitar ultrassom morfológico após a 20ª semana de gestação.
- Iniciar imediatamente espiramicina e solicitar amniocentese para melhor definição do quadro.
- Aguardar resultado de amniocentese feita o mais rapidamente possível e, caso positiva para toxoplasmose, iniciar espiramicina.
- Não administrar nenhum medicamento e orientar a paciente que a infecção provavelmente ocorreu antes da gestação.

QUESTÃO 20

Em 2011, um surto de meningite meningocócica C acometeu Ouro Branco e cidades vizinhas resultando em vacinação em massa de vários grupos populacionais. Em relação à vacina meningocócica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A vacina meningocócica C conjugada está no calendário básico de vacinação da criança do Ministério da Saúde.
- Em crianças, a vacina meningocócica C conjugada deve ser administrada em duas doses (3 meses e 5 meses de idade), com reforço aos 15 meses de idade.
- A vacina meningocócica C conjugada está rotineiramente indicada pelo Ministério da Saúde em todos os adolescentes e adultos com infecção pelo HIV.
- A vacina polissacarídica A/C, geralmente utilizada no controle de surtos, resulta em imunidade de curta duração e tem pouca eficácia em menores de dois anos de idade.



QUESTÃO 21

Homem negro de 55 anos foi recentemente encaminhado ao infectologista para avaliação de um possível retratamento da hepatite C crônica. Para definição da conduta neste tipo de paciente, é fundamental conhecer o perfil de resposta ao tratamento anterior. No caso em questão, paciente havia sido tratada previamente com peg-interferon associado a ribavirina. No início do tratamento, o exame de detecção do HCV RNA quantitativo deste paciente apresentou um resultado de 986.000 IU/ml e, na 12ª semana, a repetição do mesmo exame mostrou um valor de 199.000 UI/ml. Em relação ao tipo de resposta apresentado por este paciente na 12ª semana, ele deve ser classificado **CORRETAMENTE** como:

- a) Não respondedor.
- b) Recidivante.
- c) Respondedor parcial.
- d) Respondedor precoce.

QUESTÃO 22

A ascaridíase é uma das helmintíases mais prevalentes em nosso meio. As alternativas abaixo apresentam manifestações clínicas associadas à infecção por *Ascaris lumbricoides*, **EXCETO**:

- a) Quadro clínico de febre, cefaléia, fotofobia, rigidez nuca e eosinofilia.
- b) Quadro clínico de tosse não produtiva e dor pleurítica, associada a eosinofilia.
- c) Dor em hipocôndrio direito e febre.
- d) Dor periumbilical em cólica associada a distensão abdominal.

QUESTÃO 23

Durante uma epidemia de dengue, você atende a homem de 46 anos apresentando febre alta há 3 dias, mialgia, dor retroorbitária. Na manhã do dia do atendimento, notou exantema pelo corpo e petéquias em membros inferiores. Nega sangramentos. Nega dor abdominal ou vômitos. Exame físico sem alterações, exceto por prova do laço foi positiva. Sem sinais de ascite ou derrame pleural. Estável hemodinamicamente. Exames laboratoriais realizados no dia do atendimento: Hb: 13,8; Ht: 41%; Leucócitos 3200 céls/mm³; plaquetas: 90.000/mm³. Pensando na suspeita clínica de dengue e levando em consideração as orientações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O paciente apresenta sinais de alerta para a doença.
- b) O paciente apresenta o quadro clínico confirmado de febre hemorrágica do dengue, definido pela plaquetopenia abaixo de 100.000 e a presença de petéquias.

- c) A prova do laço positiva define o diagnóstico de dengue por ser muito específica para a dengue, não havendo necessidade de exames adicionais.
- d) Paciente pode ser manejado ambulatorialmente, com orientação para hidratação oral abundante.

QUESTÃO 24

Mulher de 69 anos, assintomática, referenciada ao infectologista com o seguinte perfil sorológico detectado após "exames de rotina": Anti-HBc total positivo, HBsAg negativo, anti-HBs negativo. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a interpretação deste conjunto de marcadores:

- a) Vacinação prévia contra hepatite B.
- b) Hepatite B crônica sem replicação.
- c) Passado de infecção pelo vírus da hepatite B, com provável resolução da infecção.
- d) Fase de imunotolerância da hepatite B crônica.

QUESTÃO 25

Em 2010, foi registrado um aumento de casos de leishmaniose tegumentar americana (LTA) na região de Patos de Minas, sendo necessária a intensificação de ações de controle da doença. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à leishmaniose tegumentar:

- a) Em grande parte dos casos, a leishmaniose mucosa resulta de leishmaniose cutânea sem tratamento ou com tratamento inadequado.
- b) A intradermoreação de Montenegro é frequentemente positiva nas formas mucosas de LTA e geralmente persiste positiva após tratamento.
- c) A úlcera típica da leishmaniose cutânea apresenta bordas planas, mal delimitadas e fundo avermelhado, granuloso.
- d) A anfotericina B é considerada droga de primeira escolha, quando existe indicação de tratamento de LTA em paciente gestante.

QUESTÃO 26

Em relação a um homem de 66 anos, não institucionalizado e sem história recente de internação hospitalar, que apresentou um acidente vascular encefálico, tendo evoluído com aspiração de conteúdo gástrico e aparecimento de infiltrado pulmonar, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O uso precoce de esquema antimicrobiano contendo anaerobicida é fundamental já que anaeróbios como o *Bacteroides* estão sempre envolvidos.
- b) O tratamento antimicrobiano de escolha é ciprofloxacino associado ao metronidazol.
- c) O uso profilático de antibiótico no tratamento precoce da pneumonite de aspiração não está indicado.
- d) A radiografia evidencia geralmente alterações em língua e lobo inferior esquerdo devido ao maior calibre e maior orientação vertical do brônquio esquerdo.

**QUESTÃO 27**

Mulher de 42 anos, portadora de HIV/aids, é internada com neurotoxoplasmose. Durante a internação e tratamento da infecção oportunista, apresentou alergia grave a sulfadiazina. Após o período de tratamento, deve-se manter profilaxia secundária para neurotoxoplasmose nesta paciente com

- a) clindamicina associada à pirimetamina e ácido fólico.
- b) sulfametoxazol/trimetoprima associada à pirimetamina e ácido fólico.
- c) dapsona associada à pirimetamina e ácido fólico.
- d) dapsona isoladamente.

QUESTÃO 28

Homem de 38 anos apresenta lesão peniana ulcerada com mais de quatro semanas de evolução, sem história ou evidência de lesões vesiculosas. Paciente é referenciado para urologista para realização de biópsia. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, enquanto aguarda-se a biópsia, deve-se iniciar tratamento empírico com qual(is) antibiótico(s)? Marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Penicilina G Benzatina, Azitromicina e Doxiciclina.
- b) Apenas Penicilina G benzatina e azitromicina.
- c) Apenas Aciclovir.
- d) Apenas Doxiciclina.

QUESTÃO 29

Em relação ao manejo adequado do quadro clínico de meningite aguda, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O uso de corticóide, quando indicado como tratamento adjuvante da meningite bacteriana, deve-se iniciar no mínimo 48h após a primeira dose do antibiótico.
- b) A principal etiologia das meningites virais são os herpesvírus, incluindo herpes vírus tipo 1 e 2, varicela-zoster, citomegalovírus e vírus Epstein-Barr.
- c) Meningite aguda causada por *Listeria* é mais frequente em crianças menores de um ano e idosos acima de 60 anos de idade, apresentado uma alta taxa de letalidade.
- d) A etiologia meningocócica frequentemente resulta em necrose do parênquima, resultando em lesões cerebrais focais com formação de abscessos.

QUESTÃO 30

Homem de 28 anos, HIV negativo, com diagnóstico de tuberculose pulmonar, realizou tratamento incompleto para tuberculose no ano anterior. À época, utilizou esquema básico por dois meses, mas abandonou o tratamento quando já apresentava melhora, sem ter feito nenhum exame de escarro de controle durante o tratamento. Há 45 dias voltou a apresentar febre e tosse produtiva, tendo procurado a unidade básica de saúde na semana anterior onde foi evidenciada positividade na pesquisa de BAAR no escarro e encaminhado ao infectologista para definição de conduta. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde nesta situação:

- a) Iniciar esquema com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol imediatamente e reavaliar após resultado de cultura e teste de sensibilidade.
- b) Iniciar esquema com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol reforçado com estreptomina imediatamente e reavaliar após resultado de cultura e teste de sensibilidade.
- c) Iniciar esquema para tuberculose MDR com estreptomina, etambutol, levofloxacino e terizidona e reavaliar após resultado de cultura e teste de sensibilidade.
- d) Aguardar resultado de teste de sensibilidade e cultura antes da definição terapêutica.