

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO DERMATOLOGISTA****QUESTÃO 21**

A dermatite de contato por sensibilização é uma reação imune do seguinte tipo:

- a) Tipo IV (hipersensibilidade tardia).
- b) Tipo II (citotóxica).
- c) Tipo III (de complexos antígenos-anticorpos solúveis).
- d) Tipo I (anafilática e anafilactóide).

QUESTÃO 22

São exemplos de dermatoses de herança autossômica dominante, **EXCETO**:

- a) Epidermólise bolhosa simples de Dowling-Meara.
- b) Doença de Darier.
- c) Síndrome de Bloom.
- d) Ictiose bolhosa de Siemens.

QUESTÃO 23

As seguintes dermatoses podem cursar com acantólise primária, **EXCETO**:

- a) Pênfigo vulgar.
- b) Dermatose por IgA linear.
- c) Doença de Darier.
- d) Doença de Hailey-Hailey.

QUESTÃO 24

Qual é o principal auto-antígeno no pênfigo foliáceo?

- a) Desmogleína 3.
- b) Desmogleína 1.
- c) Desmoplaquina 1.
- d) Desmocolina 1.

QUESTÃO 25

Qual coloração é usada para tecido elástico?

- a) Faraco.
- b) Azul-toluidina.
- c) Ácido periódico Schiff (*periodic acid Schiff* - PAS).
- d) Verhoef.

QUESTÃO 26

Todas as alternativas estão **corretas** em relação à dermatite atópica, **EXCETO:**

- a) A produção de interleucina 4 está diminuída na dermatite atópica, devido à ativação de células T predominantemente T helper 1
- b) Os infiltrados cutâneos na dermatite atópica são predominantemente de linfócitos T do tipo helper (CD4), com poucos linfócitos T supressores (CD8)
- c) A natureza familiar da dermatite atópica é conhecida, porém o modo de herança permanece obscuro
- d) Na dermatite atópica há alterações na quimiotaxia de monócitos, macrófagos e neutrófilos

QUESTÃO 27

O fenômeno de Koebner pode estar presente nas seguintes dermatoses, **EXCETO:**

- a) Líquen estriado.
- b) Psoríase.
- c) Líquen plano.
- d) Vitiligo.

QUESTÃO 28

São alterações da matriz ungueal pela psoríase, **EXCETO:**

- a) Depressões gotadas, cupuliformes (unhas em dedal).
- b) Onicorrexe.
- c) Mancha salmão.
- d) Leuconíquia.

QUESTÃO 29

Qual é a causa infecciosa mais comum de eritema nodoso?

- a) Hanseníase.
- b) Infecções estreptocócicas.
- c) Tuberculose.
- d) Salmonelose.

QUESTÃO 30

São formas de icitose que geralmente já manifestam alterações cutâneas ao nascimento, **EXCETO**:

- a) Síndrome de Netherton.
- b) Ictiose bolhosa de Siemens.
- c) Doença de Refsum.
- d) Ictiose lamelar.

QUESTÃO 31

Todas as alternativas estão **corretas** em relação ao líquen plano, **EXCETO**:

- a) Imunofluorescência direta demonstra a presença de IgG nos corpos colóides localizados subepidermicamente, sendo que IgM está ausente.
- b) Hiperqueratose com aumento focal da camada granulosa são achados característicos à histopatologia.
- c) Na porção inferior da epiderme é comum o achado de queratinócitos degenerados (corpos colóides).
- d) A mais comum das formas de líquen plano oral é a reticulada.

QUESTÃO 32

Assinale V (verdadeiro) e F (falso) para as questões abaixo:

- () A moléstia de Fox-Fordyce é uma erupção cutânea decorrente de processo patológico que ocorre nas glândulas sudoríparas écrinas
- () A periporite é uma forma de estafilococcia cutânea rara que acomete as glândulas sudoríparas écrinas
- () Onicorrexe é o descolamento da lâmina ungueal, a partir da matriz
- () Platoníquia é o aumento da espessura da unha

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) V, V, F, F
- b) F, V, F, F
- c) V, V, F, V
- d) F, V, F, V

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação às erupções vésico-bolhosas:

- a) As lesões mucosas do pênfigo paraneoplásico em geral são leves e de fácil cicatrização.
- b) O penfigóide bolhoso caracteriza-se histologicamente por bolha subepidérmica acantolítica.
- c) O herpes gestacional geralmente ocorre no primeiro trimestre da gestação.
- d) A epidermólise bolhosa adquirida está associada com autoimunidade ao colágeno tipo VII.

QUESTÃO 34

Associe as colunas, considerando as classes de agentes biológicos:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Anticorpos monoclonais quiméricos | () Alefacept |
| 2. Anticorpos monoclonais humanizados | () Efalizumab |
| 3. Anticorpos monoclonais humanos | () Infliximab |
| 4. Proteínas de fusão | () Adalimumab |

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) 4, 2, 1, 3
- b) 4, 3, 2, 1
- c) 4, 3, 1, 2
- d) 3, 2, 1, 4

QUESTÃO 35

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas proposições abaixo, relativas à terapia fotodinâmica:

- () O porfímero de sódio é o fotossensibilizador ideal para uso dermatológico.
- () Os efeitos induzidos pela terapia fotodinâmica são mediados por reações foto-oxidativas.
- () O carcinoma basocelular pigmentado responde muito bem à terapia fotodinâmica tópica.
- () A terapia fotodinâmica geralmente é muito eficaz no tratamento de ceratoses actínicas.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) F, V, V, V.
- b) V, V, F, V.
- c) F, F, V, V.
- d) F, V, F, V

QUESTÃO 36

Todas as questões estão **corretas** em relação à hanseníase, **EXCETO**:

- a) O fenômeno de Lúcio é uma vasculite leucocitoclástica que ocorre na lepra de Lúcio.
- b) A lepra de Lúcio é uma forma paucibacilar de hanseníase.
- c) O teste de Mitsuda positivo em um paciente com eritema nodoso exclui a hanseníase como causa do eritema nodoso.
- d) A dapsona, droga de primeira linha usada no tratamento da hanseníase, tem como efeito colateral mais comum a anemia hemolítica, em geral leve.

QUESTÃO 37

São formas de paniculites predominantemente lobulares, **EXCETO**:

- a) Sarcoidose subcutânea.
- b) Poliarterite nodosa cutânea.
- c) Paniculite esclerosante.
- d) Esclerema neonatal.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao lúpus eritematoso:

- a) O lúpus pérnio é uma forma de lúpus eritematoso cutâneo crônico.
- b) Em aproximadamente 50% dos casos de lúpus eritematoso cutâneo subagudo há comprometimento sistêmico, em geral intenso e grave.
- c) As lesões discóides e a lesão em asa de borboleta fazem parte dos critérios diagnósticos do lúpus eritematoso sistêmico propostos pela Academia Americana de Reumatologia.
- d) Os auto anticorpos dirigidos contra o DNA desnaturado ou de cadeia simples (ssDNA) são exclusivos do lúpus eritematoso sistêmico.

QUESTÃO 39

São formas de tuberculose cutânea secundária, **EXCETO**:

- a) Cancro tuberculoso.
- b) Tuberculose verrucosa.
- c) Tuberculose miliar aguda.
- d) Lúpus vulgar.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação às doenças sexualmente transmissíveis:

- a) A droga de escolha para o tratamento da gestante com sífilis é a eritromicina (estearato).
- b) O linfogranuloma venéreo é causado por um bacilo gram-negativo, o *Haemophilus ducrey*.
- c) A tríade de Hutchinson (queratite parenquimatosa, surdez labiríntica e dentes mostrando entalhes semilunares na borda cortante dos incisivos centrais superiores) pode ocorrer na sífilis congênita tardia.
- d) O cancróide não é autoinoculável, por isto a sua lesão clínica é única e em geral ulcerosa.