

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
MÉDICO FISIATRA**

**QUESTÃO 21**

São métodos de tratamento da *Miastenia gravis*, **EXCETO**:

- a) Timectomia.
- b) Plasmafarese.
- c) Tratamento com imunossupressores.
- d) Drogas anticolinérgicas.

**QUESTÃO 22**

O Reflexo - H ( Hoffmans) é usado clinicamente na pesquisa das condições abaixo, **EXCETO**:

- a) Neuropatia que afeta o tibial anterior.
- b) Radiculopatia de S1.
- c) Imaturidade do SNC.
- d) Lesões encefálicas.

**QUESTÃO 23**

Órtese indicada nos casos em que se observa marcha *crouched*, (agachada) com aumento da flexão dorsal dos tornozelos durante a marcha. Assinale a resposta **CORRETA**:

- a) tutor curto articulado.
- b) Molla de Codivilla.
- c) órtese de reação do solo.
- d) RGO.

**QUESTÃO 24**

Marque a afirmativa **CORRETA**:

- a) Exercício ativo assistido é indicado para ganho de força muscular em pessoas com grau normal de força.
- b) Exercício ativo resistido pode ser dividido em dinâmicos e estáticos. Os exercícios dinâmicos envolvem exercícios concêntricos e excêntricos, e o exercício estático refere aos exercícios isométricos e isocinético.
- c) Os exercícios passivos ou movimentos passivos são indicados quando o paciente é física ou cognitivamente incapaz de se movimentar de forma ativa.
- d) O exercício isocinético é realizado com uma velocidade variável e resistência constante.

**QUESTÃO 25**

Marque a associação **INCORRETA**:

- a) Fraqueza de abdutores do quadril – Sinal de Trendelenburg.
- b) Luxação congênita do quadril – Sinal de Ortolani.
- c) Paralisia facial - Sinal de Erb-Duchenne.
- d) Tromboflebite de veias profundas – Sinal de Homans.

**QUESTÃO 26**

Ao considerarmos a indicação de próteses para amputados de membros inferiores, é **CORRETO** afirmar:

- a) O soquete femural do tipo quadrilátero favorece o bloqueio do fêmur em adução, estabilizando a pelve no apoio protético.
- b) Pés dinâmicos estão indicados para pacientes geriátricos, pouco ativos e com hipersensibilidade dolorosa do coto.
- c) A possibilidade de intercâmbio entre os componentes protéticos é uma vantagem das próteses chamadas exoesqueléticas ou convencionais.
- d) pacientes jovens e ativos submetidos à amputação transfemural têm indicação do uso de joelhos livres.

**QUESTÃO 27**

Potenciais eletromiográficos geralmente polifásicos que consistem em recargas espontâneas de unidades motoras:

- a) Fasciculações.
- b) Fibrilações.
- c) Ondas positivas.
- d) Ondas negativas.

**QUESTÃO 28**

Ortese de tronco mais indicada para TTO de espondilolisteses degenerativa e fases iniciais da estenose do canal vertebral:

- a) Colete de Jewett.
- b) Colete de Knight.
- c) Colete de Putti.
- d) Colete de Williams.

**QUESTÃO 29**

No tratamento da escoliose idiopática, é **CORRETO** afirmar:

- a) Não se indica coletes a pacientes com imaturidade óssea.
- b) Curvas escolióticas abaixo de  $20^\circ$  e Risser 4 ou 5 podem responder bem ao tratamento com coletes.
- c) As curvas abaixo de  $40^\circ$  e com 0 (zero) de Risser têm indicação cirúrgica.
- d) Curvas escolióticas acima de  $30^\circ$  que progridem  $5^\circ$  ou mais em 12 meses em pacientes com imaturidade óssea devem receber colete.

**QUESTÃO 30**

Exercício que permite medir a força de cada movimento, a quantidade de trabalho desenvolvido pelo músculo e a resistência muscular ao exercício:

- a) Isométrico.
- b) Isotônico Excêntrico.
- c) Isocinetico.
- d) Passivo Assistido.

**QUESTÃO 31**

São medidas adequadas ao tratamento das tendinites, **EXCETO**:

- a) O tratamento conservador focado na redução do processo inflamatório e proteção dos tecidos adjacentes.
- b) Indicação cirúrgica em casos recidivantes.
- c) Programa focado em treinamento excêntrico.
- d) Tratamento inicial incluindo gelo, AINEs orais, repouso.

**QUESTÃO 32**

Marque a correlação clínica indevida:

- a) compressão do nervo cutâneo lateral femoral: fraqueza principalmente na adução e em menor grau da flexão e rotação do quadril.
- b) compressão do nervo obturador: dor irradiada da virilha para face interna da coxa.
- c) compressão do nervo femoral: dificuldade ou impossibilidade de estender o joelho, adução e rotação do quadril.
- d) compressão do nervo ciático (síndrome do piriforme): reprodução dos sintomas dolorosos nas manobras de rotação medial e adução coxo-femural ou contração sustentada dos adutores.

**QUESTÃO 33**

São características da bexiga neurogênica reflexa, **EXCETO**:

- a) Nas bexigas reflexas com dissinergia vesicoesfincteriana, o paciente deve manter o cateterismo intermitente (4/4 horas) ou ser submetido a esfincterectomia, após avaliação urológica.
- b) O paciente não percebe nenhuma sensação e não tem condições de voluntariamente inibir ou iniciar a micção.
- c) O esvaziamento da bexiga fica dependendo da inervação intramural da bexiga que é incapaz de produzir contração eficaz do detrusor.
- d) Medicação anticolinérgica pode ser usada quando a capacidade vesical é muito pequena.

**QUESTÃO 34**

Forma mais frequente de hemiplegia, caracterizada por plegia maciça, em geral completa e proporcional:

- a) hemiplegia talâmica.
- b) hemiplegia cortical.
- c) hemiplegia capsular.
- d) hemiplegia subcortical.

**QUESTÃO 35**

São fatores que aumentam a dor na Síndrome Dolorosa Miofascial, **EXCETO**:

- a) Estiramento passivo lento.
- b) Resfriamento muscular.
- c) Repouso prolongado.
- d) Encurtamento muscular prolongado.

**QUESTÃO 36**

**NÃO** é efeito da crioterapia:

- a) analgesia.
- b) controle de processo inflamatório agudo pós-traumático.
- c) redução temporária da espasticidade.
- d) aumento da extensibilidade do colágeno.

**QUESTÃO 37**

Lesão nervosa mais comum associada à luxação anterior do ombro:

- a) Lesão do nervo circunflexo.
- b) Lesão do nervo axilar.
- c) Lesão do nervo torácico longo.
- d) Lesão do nervo cutâneo medial.

**QUESTÃO 38**

Sobre a osteoartrite(AO) é **INCORRETO** afirmar:

- a) reforço muscular através de exercícios isotônicos resistidos são preferidos aos isométricos, pois imprimem menor estresse à articulação acometida.
- b) hemoglobina e leucopenia permanecem dentro dos limites normais.
- c) comumente a VHS está normal e não existe elevação de reagentes de fase aguda.
- d) tanto o calor quanto o frio podem ser usados para alívio sintomático em pacientes com OA.

**QUESTÃO 39**

Quanto ao diagnóstico das miopatias, é **CORRETO** afirmar:

- a) A eletroneuromiografia quando normal afasta o diagnóstico dessa enfermidade.
- b) Os estudos de neurocondção sensorial e motora estão normais nas miopatias, exceto nos casos de polineuropatia.
- c) É rara a biópsia de um músculo submetido recentemente a eletroneuromiografia revelar infiltrado inflamatório e outras alterações inespecíficas, causadas pela inserção do eletrodo de agulha.
- d) A dosagem sérica deve sempre preceder a eletroneuromiografia.

**QUESTÃO 40**

Assinale a correlação **CORRETA**:

- a) Reflexo Cremastérico – L1 e L2.
- b) Reflexo Tricipital - C5 e C6.
- c) Reflexo Patelar – L5, S1 e S2.
- d) Reflexo do músculo masseter – V e VII pares cranianos.