

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA**

QUESTÃO 21

São fatores etiológicos relacionados à litíase biliar, **EXCETO**:

- a) Hemólise crônica.
- b) Dietas hipocalóricas em obesos.
- c) Nuliparidade.
- d) Mutações do gene MDR3.

QUESTÃO 22

São doenças colorretais luminais associadas ao desenvolvimento de constipação intestinal, **EXCETO**:

- a) Sífilis.
- b) Tuberculose.
- c) Endometriose.
- d) Dolicocólon.

QUESTÃO 23

A doença celíaca é uma condição primariamente intestinal, que frequentemente leva à má absorção de nutrientes e desnutrição. Entretanto, cursa também com manifestações extraintestinais entre as quais **NÃO** é observada:

- a) Unhas em vidro de relógio.
- b) Acantose nigricante.
- c) Hepatoesplenomegalia.
- d) Queilite e glossite.

QUESTÃO 24

Escolha a afirmativa **CORRETA** em relação à Retocolite Ulcerativa:

- a) A abordagem terapêutica da proctite tem como base o uso de corticóides endovenosos seguidos de terapia oral com prednisona.
- b) É descrita frequente associação com doença celíaca.
- c) Na doença em atividade, a apresentação histológica microscópica é marcada pela presença de microabscesso, perda de arquitetura das criptas e ausência de infiltrado inflamatório.
- d) A velocidade de hemossedimentação (VHS) em 60 minutos está caracteristicamente abaixo de 20mm nas formas graves.

QUESTÃO 25

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo:

- () Púrpura de Henoch-Scönlein pode ser uma manifestação extra-hepática de Hepatite B.
- () A elevação dos níveis de ALT (TGP) em pacientes com Hepatite C crônica é sustentada e não flutuante.
- () Pode haver Hepatite B crônica em atividade com HbeAg negativo e anti-HBe positivo.
- () A peguilação do Interferon $\alpha 2a$ ou $\alpha 2b$ dispensa a associação com Ribavirina no tratamento de pacientes com Hepatite C.

- a) V, F, V, F
- b) V, V, F, V
- c) F, F, F, V
- d) F, V, V, F

QUESTÃO 26

Em relação à Doença Hepática Gordurosa Não-Alcoólica (DHGNA) todas afirmativas abaixo estão **erradas, EXCETO**:

- a) A melhor estratégia para diferenciação de esteato-hepatite alcoólica de esteato-hepatite não alcoólica é a análise histológica da biópsia hepática.
- b) O ácido ursodesoxicólico trouxe consideráveis avanços terapêuticos no tratamento da DHGNA, especialmente em suas formas avançadas com fibrose, em que mostrou melhora histológica e funcional quando administrado por mais de 3 meses.
- c) A resistência insulínica periférica tipicamente observada em indivíduos portadores de síndrome metabólica é um fator crucial na fisiopatologia da DHGNA.
- d) A esteatose microvesicular e o infiltrado inflamatório mononuclear são achados histológicos típicos de DHGNA em sua forma de esteato-hepatite.

QUESTÃO 27

São fatores etiológicos importantes para o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas do esôfago, **EXCETO**:

- a) Tabagismo.
- b) Alcoolismo.
- c) Epitélio metaplásico de Barrett com displasia.
- d) Lesões cáusticas prévias do esôfago.

QUESTÃO 28

Em relação à Gastrite Linfocítica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Tem como sinonímia os termos Gastrite Varioliforme e Gastrite Erosiva Crônica.
- b) O diagnóstico histológico é feito a partir do achado de mais de 30 linfócitos intraepiteliais/100 células epiteliais.
- c) Endoscopicamente apresenta-se como múltiplas nodulações com erosões centrais e hiperemia circunjacente.
- d) É uma condição iminente para o estabelecimento de um linfoma gástrico do MALT, demandando para o tratamento o uso de corticosteróides e doxorrubicina.

QUESTÃO 29

A análise do fluido de cistos pancreáticos pode ser útil na diferenciação das várias etiologias. Associe as letras aos números (em romanos):

- A. Cistoadenoma seroso
 - B. Cistoadenoma mucinoso
 - C. Cistoadenocarcinoma mucinoso
 - D. Cistos benignos não neoplásicos
-
- I. CA 19-9 elevado e CA 72-4 baixo
 - II. Amilase alta
 - III. Viscosidade elevada e CA 72-4 elevado
 - IV. CEA baixo e amilase baixa

Assinale a afirmativa que contém as associações **CORRETAS**:

- a) A-IV; B-I; C-III; D-II
- b) A-III; B-II; C-I; D-IV
- c) A-II; B-IV; C-III; D-I
- d) A-I; B-III; C-IV; D-II

QUESTÃO 30

São afirmativas **corretas** em relação às hepatopatias relacionadas à gravidez, **EXCETO**:

- a) Na Síndrome HELLP uma grave complicação é a ocorrência de hemorragia subcapsular intra-hepática.
- b) Na colestase da gravidez, o uso da colestiramina está formalmente contra-indicado pelos riscos de dano fetal.
- c) A esteatose aguda da gravidez geralmente se instala no terceiro trimestre da gestação e pode levar a sinais de insuficiência hepática aguda além de rotura hepática.
- d) Pode ocorrer hiperuricemia na pré-eclâmpsia e na esteatose aguda da gravidez.

QUESTÃO 31

São possibilidades descritas de evolução na história natural dos cistos pancreáticos benignos todas as abaixo, **EXCETO**:

- a) Regressão após ruptura.
- b) Persistência assintomática.
- c) Desenvolvimento de sintomas compressivos.
- d) Malignização.

QUESTÃO 32

São complicações locais da pancreatite crônica, **EXCETO**:

- a) Desnutrição.
- b) Trombose de veia esplênica.
- c) Paniculite nodular liquefativa.
- d) Icterícia obstrutiva.

QUESTÃO 33

Em relação aos fatores de risco importantes para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- a) Uso de álcool em portadores de vírus B, mas não em portadores de vírus C.
- b) Sexo feminino para portadores do vírus C.
- c) Em pacientes portadores de vírus B, a presença de replicação viral e o sexo masculino.
- d) Carga viral elevada em portadores de vírus C e mutação pré-core em portadores de vírus B.

QUESTÃO 34

Em relação à litíase da via biliar principal, todas as afirmativas estão **corretas, EXCETO**:

- a) Pacientes com colangite supurativa aguda não devem ser submetidos a drenagem em função do risco de disseminação bacteriana hematogênica.
- b) *Pseudomonas aeruginosa* e *Bacteróides fragilis* são bactérias frequentemente associadas à colangite.
- c) Cirrose biliar secundária e abscesso hepáticos podem complicações relacionadas à litíase da via biliar principal.
- d) Em pacientes idosos com elevado risco cirúrgico, pode ser considerada a opção terapêutica de papilotomia endoscópica sem colecistectomia.

QUESTÃO 35

Na classificação de Bismuth dos colangiocarcinomas peri-hilares, um tumor que envolve a confluência dos ductos principais direito e esquerdo, sem acometimento dos ramos secundários, é um tipo:

- a) II
- b) I
- c) IIIa
- d) IIIb

QUESTÃO 36

São etiologias de hemorragia digestiva alta relacionadas à cirrose hepática, **EXCETO**:

- a) Ectasia vascular antral.
- b) Varizes esofagogástricas.
- c) Gastropatia hipertensiva.
- d) Lesão de Dieulafoy.

QUESTÃO 37

São efeitos adversos relacionados ao uso de Interferon Alfa 2a no tratamento da hepatite C crônica, **EXCETO**:

- a) Neutropenia.
- b) Hipertireoidismo.
- c) Astenia.
- d) Depressão.

QUESTÃO 38

Todas as afirmativas em relação ao Esôfago de Barrett estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) A imuno-histoquímica pode ser útil na diferenciação de metaplasia intestinal do esôfago de Barrett da metaplasia intestinal gástrica.
- b) É classificado como longo quando a metaplasia intestinal apresenta mais de 2 cm de extensão.
- c) Úlcera péptica do esôfago frequentemente está associada ao esôfago de Barrett.
- d) Quando o Barrett se estabelece, a sintomatologia relacionada à doença por refluxo gastroesofágico costuma diminuir.

QUESTÃO 39

São síndromes genéticas relacionadas como fatores de risco para o desenvolvimento de câncer colorretal, **EXCETO**:

- a) Gardner.
- b) Peutz-Jeghers.
- c) Turcot.
- d) Astler-Coller.

QUESTÃO 40

Assinale a droga ou combinação de drogas que pode ser considerada como alternativa terapêutica na hepatite autoimune:

- a) Ciclosporina A.
- b) Infliximab.
- c) Interferon alfa.
- d) Ácido ursodesoxicólico e dapsona.