

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
MÉDICO OFTALMOLOGISTA****QUESTÃO 21**

Qual substância é utilizada no tratamento antirreflexo das lentes oftálmicas orgânicas?

- a) fluoreto de magnésio.
- b) poliuretano.
- c) quartzo.
- d) sal de potássio.

**QUESTÃO 22**

A régua de Prince serve para medir:

- a) amplitude de acomodação.
- b) distância pupilar.
- c) ponto próximo de convergência.
- d) proptose.

**QUESTÃO 23**

O nome da coloração utilizada para demonstrar a presença de cálcio em histopatologia ocular é:

- a) Azul Alciano.
- b) Fontana-Masson.
- c) Vermelho Congo.
- d) Von Kossa.

**QUESTÃO 24**

Na doença ocular tiroideana, o retardo na descida da pálpebra superior ao olhar para baixo constitui o sinal de:

- a) Dahrymple.
- b) Kocher.
- c) Munson.
- d) Von Graefe.

**QUESTÃO 25**

Considerando as doenças inflamatórias da órbita, o tratamento com a ciclofosfamida sistêmica está indicado na:

- a) Dacrioadenite aguda.
- b) Granulomatose de Wegener.
- c) Miosite orbitária.
- d) Síndrome de Tolosa-Hunt.

**QUESTÃO 26**

Na Síndrome de Centurion ocorre:

- a) afastamento do ponto lacrimal inferior do globo ocular devido ao fato de a carúncula ser volumosa.
- b) Conjuntivocalaze.
- c) deslocamento do ponto lacrimal para fora do lago lacrimal, em decorrência de a base do nariz ser proeminente.
- d) estenose do ponto lacrimal.

**QUESTÃO 27**

É correto afirmar que o uso de fenitoina pode estar associado a:

- a) Madarose.
- b) Poliose.
- c) Tricomegalia.
- d) Triquíase.

**QUESTÃO 28**

No exame biomicroscópico da catarata congênita, a opacidade tipo "gota de óleo" central é característica da:

- a) galactosemia.
- b) Síndrome de Hallerman-Streiff-François.
- c) Síndrome de Lowe.
- d) Síndrome de Nance-Horan.

**QUESTÃO 29**

As rosetas de Flexner-Wintersteiner são observadas no exame histológico do tumor da retina:

- a) Astrocitoma.
- b) Hamartoma combinado.
- c) Hemangioblastoma.
- d) Retinoblastoma.

**QUESTÃO 30**

Quando a manifestação mais grave da retinopatia da prematuridade (ROP) é a ocorrência de crista na função da retina periférica avascular imatura com a retina posterior vascularizada, é **CORRETO** afirmar que a ROP está no seu estágio:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

**QUESTÃO 31**

O defeito de campo visual por lesão das radiações ópticas temporais se apresenta como:

- a) hemianopsia homônima completa.
- b) quadrantanopsia superior bitemporal.
- c) quadrantanopsia homônima inferior contralateral (pie on the floor).
- d) quadrantanopsia homônima superior contralateral (pie on the Sky).

**QUESTÃO 32**

A densidade de células endoteliais (células/mm<sup>2</sup>) na córnea do adulto é de aproximadamente

- a) 2.000
- b) 2.500
- c) 3.000
- d) 3.500

**QUESTÃO 33**

As glândulas de secreção lacrimal situadas na lâmina própria da conjuntiva palpebral, próxima ao fórnice superior são as de

- a) Krause.
- b) Meibômio.
- c) Zeis.
- d) Wolfring.

**QUESTÃO 34**

O agente infeccioso mais comum da *oftalmia neonatorum* em países desenvolvidos é o (a)

- a) Chlamydia trachomatis
- b) Herpes simples tipo II
- c) Neisseria gonorrhoeae
- d) Staphylococcus aureus

**QUESTÃO 35**

A ceratite por *Acanthamoeba* tem como sinal patognomônico:

- a) abscesso em anel.
- b) ceratoneurite radial.
- c) infiltrados estromais focais anteriores.
- d) pseudodentritos epiteliais.

**QUESTÃO 36**

O tratamento da ambliopia por oclusão nas crianças portadoras de estrabismo não alternante ou com anisometropia importante deve ser iniciado aos seis meses de idade, sendo o esquema de oclusão para criança de 3,5 anos de idade:

- a) um dia no olho dominante e um dia no amblíope.
- b) dois dias no olho dominante e um dia no amblíope.
- c) três dias no olho dominante e um dia no amblíope.
- d) quatro dias no olho dominante e um dia no amblíope.

**QUESTÃO 37**

O aumento do fluxo sanguíneo do disco óptico é obtido com a droga antiglaucomatosa tópica:

- a) Betaxolol.
- b) Brinzolamida.
- c) Dorzolamida.
- d) Pilocarpia.

**QUESTÃO 38**

O sinal de Summerskill está presente na

- a) Acromegalia.
- b) Miastenia grave.
- c) Neurofibromatose.
- d) Uremia.

**QUESTÃO 39**

Os nódulos de Delen-Fuchs são observados na:

- a) Espondilite anquilosante.
- b) Sarcoidose.
- c) Síndrome de Behcet.
- d) Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada.

**QUESTÃO 40**

No trauma ocular o paciente pode:

- a) apresentar hematoma anular bilateral (olhos de panda) na fratura da base do crânio.
- b) assoar o nariz na fratura em blow out da parede medial da órbita.
- c) submeter-se a ressonância magnética para localização de corpo estranho metálico.
- d) usar pomadas oftálmicas antibióticas para evitar infecções nas lacerações de córnea.