

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO PEDIATRA**

QUESTÃO 21

Sobre a insuficiência cardíaca congestiva, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) A cardiomegalia na radiografia de tórax ocorre em todos os casos.
- b) Os sintomas de insuficiência cardíaca podem ser divididos de acordo com sua causa fisiopatológica em congestão venosa sistêmica, congestão venosa pulmonar, ação adrenérgica e baixo débito e choque.
- c) O diagnóstico de ICC e a classificação de sua gravidade são basicamente clínicos.
- d) São fatores agravantes da ICC a anemia, a febre, acidose e hipervolemia, por exemplo.

QUESTÃO 22

Sobre o choque, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O resultado final do choque é a queda do volume de oxigênio transportado.
- b) O choque refratário é a persistência de sinais de hipoperfusão periférica e hipotensão por mais de uma hora, apesar de reposição volêmica, oxigenação, correção de acidose e sustentação inotrópica adequada.
- c) A morte encefálica cursa com um quadro de choque cardiogênico.
- d) O nível sérico de lactato tem valor prognóstico evolutivo.

QUESTÃO 23

Sobre a doença reumática, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Os sinais maiores são cardite, poliartrite, coreia, eritema marginatum e nódulo subcutâneo.
- b) A profilaxia secundária é feita com diagnóstico e tratamento adequado das faringites e amigdalites.
- c) O diagnóstico é eminentemente clínico, uma vez que nenhum exame laboratorial ou combinação de exames tem especificidade suficiente para diagnosticá-la.
- d) Nos casos de cardite em fase aguda, o repouso absoluto é mandatório.

QUESTÃO 24

Sobre as arritmias, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) A taquicardia ventricular apresenta-se com QRS estreito, menor que 0,08 segundos.
- b) A taquicardia sinusal tem uma causa presente, apresenta ondas P normais, normalmente com frequência cardíaca menor que 180 bpm em crianças.
- c) O tratamento da taquicardia supraventricular se o acesso venoso estiver presente é o uso de adenosina.
- d) Nos casos de taquicardia ventricular ou supraventricular, a cardioversão elétrica deve ser sincronizada.

QUESTÃO 25

Sobre a criança com sopro, é **correto** afirmar que, **EXCETO**:

- a) Mais de 70% das crianças apresentam algum tipo de sopro inocente ao longo da vida.
- b) Os sopros inocentes são, por exemplo, o sopro de Still, de fluxo pulmonar, mamário e sistólico supra clavicular.
- c) Os sopros de área tricúspide são aqueles decorrentes de comunicação intra-ventricular, sopro inocente de Still, estenose subaórtica hipertrófica, insuficiência tricúspide e tetralogia de Fallot.
- d) São características dos sopros inocentes: serem somente diastólicos, podem ser holossistólico, podem ter irradiação e não varriam.

QUESTÃO 26

Sobre as infecções de vias aéreas superiores, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) As infecções bacterianas compreendem em torno de 10 a 20% das infecções de vias aéreas superiores.
- b) A amigdalite estreptocócica cursa com início abrupto, febre alta, prostração, mal-estar.
- c) As amigdalites de repetição caracterizam por mais de três episódios em seis meses ou quatro em uma explicação causal convincente.
- d) Nos casos de otite média aguda recorrente, são necessárias medidas cirúrgicas obrigatoriamente.

QUESTÃO 27

Sobre a rinite alérgica, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: asma, ar nas cidades industrializadas e poluídas, pais fumantes e animais dentro de casa.
- b) O tratamento é feito num primeiro momento com corticosteróides tópicos nasais por um ou dois meses.
- c) Os sinais mais frequentes são prurido nasal, rinorreia clara e tosse por gotejamento posterior.
- d) O diagnóstico diferencial se faz com pólipos, desvio de septo, hipotireoidismo, sífilis congênita.

QUESTÃO 28

São afirmativas **verdadeiras** em relação às pneumonias, **EXCETO**:

- a) O hemograma é pouco confiável para confirmar ou afastar o diagnóstico de pneumonia.
- b) O *Staphylococcus aureus* pode causar quadros graves e fulminantes em cerca de 70% dos lactentes.
- c) No caso de broncoespasmo associado, normalmente não existe um quadro infeccioso.
- d) A pneumonia deve ser suspeitada naquelas crianças com quadro clínico sugestivo de infecção bacteriana, geralmente febre, prostração, associada a tosse e taquipneia.

QUESTÃO 29

São afirmativas **verdadeiras** em relação à asma, **EXCETO**:

- a) A história familiar é importante, pois aquelas crianças que têm um ou dois pais asmáticos tem, respectivamente, 25% e 50% de chances de terem asma.
- b) Os corticosteróides inalatórios podem substituir os orais na crise aguda de asma, uma vez que possuem menos efeitos colaterais.
- c) A bronquiolite deve ser considerada naqueles casos de primeiro episódio abaixo de seis meses de idade.
- d) O uso de beta-2 agonista de curta duração administrado por via intravenosa pode ser uma alternativa farmacológica na tentativa de se evitar a evolução para insuficiência respiratória e a necessidade de suporte ventilatório.

QUESTÃO 30

São afirmativas **corretas** em relação diarreia, **EXCETO**:

- a) O uso de antidiarréicos está preconizado nos casos graves de desidratação.
- b) O quadro clínico é representado por alteração do conteúdo das fezes que se torna líquido ou pastoso e pela frequência das evacuações.
- c) Os exames laboratoriais são de pouca ajuda, entretanto sendo importante naqueles casos de crianças debilitadas ou imunossuprimidas.
- d) Dentre as indicações para hidratação venosa, estão: vômitos incontroláveis e frequentes, íleo paralítico, depressão neurológica grave e sinais de choque.

QUESTÃO 31

São afirmativas **corretas** em relação à parasitose intestinal, **EXCETO**:

- a) Normalmente, as manifestações são comuns a diversos tipos de parasitose como, por exemplo, a anorexia, irritabilidade, distúrbios do sono.
- b) Pacientes imunossuprimidos podem ter quadros graves de giardíase e estrogiloidíase.
- c) O tratamento conservador da semiobstrução intestinal é feito com jejum, sonda, hidratação venosa, óleo mineral, piperazina e antiespasmódico.
- d) A repetição do tratamento muitas vezes é desnecessária, pois a causa mais frequente de reinfecção é exógena.

QUESTÃO 32

São afirmativas **corretas** em relação à doença do refluxo gastroesofágico, **EXCETO**:

- a) A pHmetria é considerada o exame complementar padrão ouro para o diagnóstico.
- b) No manejo, devem-se observar os seguintes aspectos: a posição, a alimentação, uso de antiácidos e antieméticos ou procinéticos.
- c) O refluxo é uma regurgitação não forçada do conteúdo gástrico, podendo ser um fenômeno fisiológico em dois terços dos lactentes.
- d) As cirurgias estão indicadas nos casos graves e refratários ao tratamento clínico correto.

QUESTÃO 33

São afirmativas **corretas** em relação à colestase neonatal, **EXCETO**:

- a) Deve ser suspeitada em toda icterícia persistente por mais de 14 dias de vida.
- b) É essencial identificar precocemente os casos de atresia de vias biliares ou de cisto de colédoco porque podem ser corrigidos cirurgicamente.
- c) Dentre os exames essenciais para diferenciar hepatite de atresia de vias biliares, temos a colangioressonância.
- d) Síndromes genéticas como, por exemplo, a síndrome de Down, podem ser causa de colestase.

QUESTÃO 34

São afirmativas **corretas** em relação à infecção urinária, **EXCETO**:

- a) São fatores de risco o sexo feminino, a ureterocele, constipação intestinal e oxiuríase.
- b) Pode-se descartar infecção urinária nos casos de ausência de piúria.
- c) Nas crianças menores de dois anos, é comum que as manifestações clínicas sejam inespecíficas, como por exemplo irritabilidade, febre, vômitos e diarreia.
- d) Após uma infecção urinária bem documentada, deve ser feita pelo menos uma ultrassonografia renal.

QUESTÃO 35

Sobre a insuficiência renal aguda, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Os sinais mais frequentes são oligúria ou anúria seguidos de edema e congestão.
- b) Podem estar presentes sinais de desidratação, como por exemplo, turgor diminuído, taquicardia e extremidades frias.
- c) Pode ocorrer alcalose metabólica grave devido a baixa excreção do bicarbonato.
- d) A hiperpotassemia pode ser tratada com uma resina de troca de nível intestinal como por exemplo o Sorcal®.

QUESTÃO 36

São afirmativas **corretas** em relação ao traumatismo craniano, **EXCETO**:

- a) A classificação quanto à gravidade é geralmente feita pelo nível do coma.
- b) A concussão é a perda transitória das funções neurológicas, com ou sem período de inconsciência.
- c) Dentre os sinais de alarme no caso de traumas menores, podem-se citar: assimetria de pupilas, fratura de crânio e vômitos em jato.
- d) O "Brain Swelling" é a lesão axonal causada por torção, estiramento ou cisalhamento.

QUESTÃO 37

Sobre a hiponatremia, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O tratamento independe da volemia e deve ser feito com uma solução de NaCl a 3%.
- b) Manifesta-se como fraqueza, letargia, vômitos, cefaleia e até convulsões.
- c) Dentre as complicações, podem-se citar hipertensão intracraniana, edema cerebral, herniação e mielinólise pontina central.
- d) Dentre as causas, podem-se citar a imaturidade renal do prematuro, diarreia, insuficiência cardíaca congestiva e polidipsia psicogênica.

QUESTÃO 38

Sobre a acidose metabólica, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) A diarreia é um caso de acidose metabólica por aumento do anion gap devido ao excesso de ácido.
- b) A gasometria é o exame laboratorial mais importante para definição.
- c) O tratamento pode ser feito por meio da administração de bicarbonato.
- d) Clinicamente se manifesta por taquipneia, hiperpneia, depressão miocárdica, náuseas e vômitos.

QUESTÃO 39

Sobre as anemias na infância, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Trata-se da redução da concentração da hemoglobina abaixo dos níveis mínimos normais para idade e sexo.
- b) A ferritina, por ser uma proteína que se liga ao ferro nos tecidos, está aumentada nos casos de anemia ferropriva.
- c) Nos casos com reticulócitos aumentados, elas podem ser microcíticas ou normocíticas.
- d) Os pacientes em uso de fenobarbital podem apresentar anemia por deficiência de ácido fólico.

QUESTÃO 40

Sobre a leishmaniose, é **correto** afirmar **EXCETO**:

- a) Os achados clínicos frequentes são: febre prolongada, emagrecimento, hepatomegalia, esplenomegalia e distensão abdominal.
- b) O hemograma mostra anemia, leucopenia com neutropenia e eosinopenia, bem como plaquetopenia.
- c) A anfotericina B, por ser menos leishmanicida que os antimoniais, é somente utilizada como segunda escolha no tratamento.
- d) No tratamento das infecções graves, devem-se considerar os conceitos de abordagem do neutropênico febril.