

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Pronto Atendimento – Pediatria

QUESTÃO 01

Sobre o recém nascido asfixiado grave são corretas as afirmativas, **EXCETO**:

- a) As convulsões são freqüentes, mas o fenobarbital deve ser evitado, pois a sedação e depressão do sistema nervoso central prejudicam a observação neurológica e prolongam a necessidade de ventilação.
- b) Dentre as causas de asfixia perinatal pode-se citar a hipercontração uterina, ruptura de cordão umbilical, hipoxemia por doença materna.
- c) Na repercussão cardíaca pode causar miocardiopatia isquêmica, insuficiência tricúspide, hipotensão e choque cardiogênico.
- d) As manifestações clínicas podem aparecer após alguns dias da asfixia
- e) São fatores de risco a hipertensão materna crônica, infecção materna e prematuridade.

QUESTÃO 02

No que concerne ao choque todas são afirmativas corretas, **EXCETO**:

- a) A hipóxia e a hipoperfusão tecidual são características do choque e levam a uma disfunção progressiva dos órgãos com acidose láctica crescente.
- b) Dentre os sinais tardios de choque, temos isquemia gastrointestinal, bem como um edema pulmonar não hidrostático.
- c) Apenas no choque cardiogênico com sinais de congestão não há indicação de reposição rápida de volume.
- d) No choque distributivo existe uma persistência de sinais de hipoperfusão periférica e hipotensão, apesar da reposição volêmica.
- e) O choque cardiogênico obstrutivo pode ter por causa o pneumotórax hipertensivo, a hipertensão pulmonar grave e o tamponamento cardíaco.

QUESTÃO 03

São alterações ECG da hipopotassemia, **EXCETO**:

- a) Presença de onda U.
- b) Extra-sístolia ventricular.
- c) Fibrilação.
- d) Depressão do seguimento ST.
- e) Onda T espiculada simétrica.

QUESTÃO 04

São afirmativas corretas em relação à insuficiência renal aguda, **EXCETO**:

- a) A hiperfosfatemia exige restrição de fosfato oral ou na nutrição parenteral.
- b) São causas pré-renais, por exemplo, hipovolemia e desidratação, hipotensão prolongada e policitemia.
- c) A hipopotassemia dilucional é uma alteração freqüente e deve ser tratada com bicarbonato.
- d) No tratamento, existe indicação de diálise nos pacientes portadores de insuficiência renal com uremia grave, normalmente acima de 200 mg/dl.
- e) Os sinais mais freqüentes são a oligúria ou anúria seguidos de edema e congestão.

QUESTÃO 05

Sobre a analgesia e sedação é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os antidepressivos tricíclicos podem ser utilizados como coadjuvante de tratamento da dor crônica.
- b) Em crianças maiores, a melhor maneira de avaliar a dor é perguntando à criança.
- c) Na sedação profunda, o estado de consciência fica diminuído, com manutenção dos reflexos protetores.
- d) A anestesia para procedimentos como, por exemplo, mielograma deve ser feita por médicos treinados em reanimação e suporte de vida.
- e) A cetamina não pode ser sempre utilizada em paciente que necessita de uma punção lombar, uma vez que aumenta a pressão intracraniana.

QUESTÃO 06

Sobre a leishmaniose visceral, todas são afirmativas corretas, **EXCETO**:

- a) Deve ser suspeitada em pacientes com febre e pancitopenia.
- b) A anfotericina B, apesar de menos leishmanicida que o antimoniato, atua nas formas promastigotas e amastigotas do parasita.
- c) O aspirado de medula óssea e do baço são formas de confirmar a doença.
- d) O principal efeito colateral do antimoniato-N-metil glucamina é decorrente de sua ação sobre o aparelho cardiovascular.
- e) O diagnóstico diferencial pode ser feito com leucemia, linfoma, endocardite bacteriana, esquistossomose hepatoesplênica.

QUESTÃO 07

Sobre a dengue é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Nos casos de dengue clássica não existem petéquias ou qualquer tipo de manifestação hemorrágica.
- b) O período de incubação entre a picada e o início da doença varia de 3 a 5 dias.
- c) A primeira manifestação é a febre alta, de início abrupto, seguido de cefaléia.
- d) A dor abdominal intensa e contínua é um sinal de alerta de uma forma grave de dengue.
- e) A Sorologia pode ser feita após o 5º dia de início da doença.

QUESTÃO 08

Sobre a insuficiência hepática é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A hipoglicemia é sinal de bom prognóstico.
- b) As manifestações da doença hepáticas são prurido, icterícia, prurido, anorexia e vômitos.
- c) As alterações de coagulação são importantes marcadores da gravidade da disfunção hepática.
- d) O Flumazenil pode reverter alguns casos de encefalopatia.
- e) O corticosteróide pode piorar os casos de hepatite fulminante.

QUESTÃO 09

Sobre a dengue hemorrágica é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Cerca de 24h após a queda da febre, ocorre deterioração clínica com retorno da febre, manifestações hemorrágicas e diminuição do volume plasmático.
- b) Sinais de alerta da forma grave são: sinais de derrame pleural, pericárdico ou ascite, hemorragias e aumento repentino do hematócrito.
- c) O controle sanitário da doença é essencial.
- d) Ocorre um aumento do fibrinogênio por aumento da reação inflamatória.
- e) O extravasamento plasmático produz aumento progressivo do hematócrito.

QUESTÃO 10

Sobre os acidentes com animais peçonhentos é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os acidentes ofídicos são os mais freqüentes em nosso meio.
- b) Os acidentes ofídicos são mais comuns na mão, pois a vítima normalmente está realizando atividade rural.
- c) O veneno das abelhas, em doses altas, pode produzir hipotensão, bradicardia e extra-sístolia através de estimulação vagal.
- d) Restos de material de construção como tijolos e telhas facilitam os acidentes com aranhas e escorpiões.
- e) O tratamento de suporte muitas vezes é o único tratamento disponível.

QUESTÃO 11

Sobre as queimaduras é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A profundidade da lesão depende do agente etiológico e do tempo de exposição ao mesmo.
- b) Dentre as primeiras medidas a serem realizadas, deve-se retirar a roupa ou substâncias aderidas à pele queimada e fazer desbridamento das bolhas nos grandes queimados.
- c) As principais complicações tardias decorrem dos transtornos hidroeletrólíticos e insuficiência renal aguda.
- d) A prevenção constitui a única forma realmente eficaz para evitar as seqüelas e o óbito.
- e) É um dos acidentes mais freqüentes em crianças.

QUESTÃO 12

Sobre a anafilaxia e reações alérgicas graves é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) É suspeitada no aparecimento súbito de colapso vascular, obstrução respiratória alta ou broncoespasmo.
- b) Os corticosteróides devem ser usados imediatamente, como primeira escolha de tratamento.
- c) Geralmente inicia-se com sensação de formigamento ou prurido.
- d) As causas mais comuns são medicamentos, vacinas, alimentos e picada de insetos.
- e) O uso de um torniquete no local da picada ajuda a interromper o contato com o agente causador.

QUESTÃO 13

Sobre a neutropenia febril é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A regra geral de cobertura com antibióticos é o uso inicial contra bactéria gram positivas, posteriormente contra fungos e ao final para bactérias gram negativas.
- b) Representa um risco de vida significativo entre 6 a 30 horas.
- c) A duração da neutropenia por mais de 10 dias indica alto risco.
- d) Por ter capacidade restrita em produzir inflamação, as infecções podem ter manifestações sutis.
- e) Se houver cateter de longa permanência, a cultura de sangue aspirado deve ser feita.

QUESTÃO 14

Todas são causas de parada cardíaca em dissociação eletromecânica (atividade elétrica sem pulso), **EXCETO**:

- a) Pneumotórax hipertensivo.
- b) Hipovolemia extrema.
- c) Embolia pulmonar maciça.
- d) Hiperpotassemia grave.
- e) Acidentes elétricos e raios.

QUESTÃO 15

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar **EXCETO**:

- a) O quadro clínico é variável, desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada à sepse.
- b) Em crianças menores de 2 anos, é mais freqüente que as manifestações sejam inespecíficas.
- c) Na ausência de piúria não existe possibilidade de infecção urinária.
- d) A melhora clínica ocorre em dois a três dias de tratamento.
- e) São fatores de risco o sexo feminino, a constipação intestinal, oxiúriase.

QUESTÃO 16

Sobre os distúrbios hemorrágicos é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) As alterações plaquetárias e a deficiência de vitamina K são os defeitos hemostáticos mais freqüentes.
- b) A Púrpura de Henoch Schönlein caracteriza-se pela redução das plaquetas e infiltração na vasculatura.
- c) A púrpura trombocitopênica imune é a mais prevalente dentre as alterações plaquetárias.
- d) Medicamentos como as penicilina, anti-convulsivantes e antiinflamatórios não esteróides podem ser causas de plaquetopenia.
- e) O tempo de protrombina avalia as vias extrínsecas e comuns da coagulação.

QUESTÃO 17

São manifestações da cardite reumática aguda, **EXCETO**:

- a) Aumento dos intervalos PR e QTc.
- b) A taquicardia tende a melhorar durante o sono.
- c) Abafamento de primeira bulha.
- d) Sopro holossistólico, de alta frequência na ponta, irradiando para axila esquerda.
- e) Dor precordial e atrito pericárdico.

QUESTÃO 18

Sobre a insuficiência respiratória é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Não é o principal fator de risco para parada cardíaca em criança.
- b) Podem ter os seguintes mecanismos: restrição, obstrução e desequilíbrio ventilação- perfusão.
- c) Os sinais mais importantes são: taquidispnéia, as tiragens e as retrações, o uso de musculatura acessória, batimentos de aletas nasais e cianose.
- d) Se o paciente for portador de anemia, a cianose terá início tardio.
- e) A estratégia geral de tratamento é resumida na tríade: vias aéreas permeáveis, ventilação adequada e oxigenação.

QUESTÃO 19

Sobre as convulsões é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O exame de líquido céfalo-raquidiano está sempre indicado na suspeita de infecção do sistema nervoso central, hemorragia subaracnóide e doença desmielinizante.
- b) Deve-se garantir vias aéreas, fornecer oxigênio e em caso de apnéia realizar ventilação por pressão positiva nos casos de crise convulsiva.
- c) O eletroencefalograma é normal em cerca de 40% dos casos de epilepsia.
- d) As crises convulsivas podem ser secundárias a infecção, hipoglicemia, hiponatremia, hipóxia.
- e) O tratamento de primeira escolha para as crises tônico-clônicas generalizadas é o hidantal.

QUESTÃO 20

Sobre o traumatismo crânio-encefálico é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A síndrome clínica é causada pelo efeito direto do trauma e das lesões secundárias como por exemplo asfixia, acidose, edema e anemia.
- b) A hipertensão intracraniana é caracterizada por abaulamento de fontanela, sonolência, piora do nível de consciência, bradicardia, hipertensão, cefaléia
- c) São sinais de alerta para gravidade do caso: sinais neurológicos focais, assimetria de pupilas, vômitos repetidos etc.
- d) Os casos leves de lesão axonal se assemelham aos casos de concussão.
- e) O melhor exame para avaliar a evolução do quadro é a tomografia computadorizada de crânio de forma repetida.

QUESTÃO 21

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**:

- a) A hiper-reatividade pode ser irreversível ao uso de beta-agonistas.
- b) É uma doença inflamatória crônica, marcada por hiper-reatividade brônquica variável.
- c) Determinados agentes viróticos e o micoplasma podem desencadear crise asmática em indivíduos predispostos.
- d) Fazem parte do diagnóstico diferencial em lactentes: doença do refluxo gastroesofágico, aspiração de corpo estranho, parasitose, displasia broncopulmonar, fibrose cística, estados de imunodeficiência.
- e) Os raios X de tórax não precisam ser feitos de rotina nos casos leves.

QUESTÃO 22

Sobre as pneumonias é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Pode ser causado por bactérias, vírus, micoplasma ou por aspiração.
- b) O hemograma é bastante confiável para confirmar ou afastar o diagnóstico de pneumonia.
- c) Dentre os mecanismos de proteção, tem-se a tosse, sistema mucociliar e as imunoglobulinas.
- d) Em crianças maiores, a pneumocistose acomete aquelas imunodeprimidas: AIDS, collagenoses, desnutridos, oncológicos e leucêmicos.
- e) O tratamento é feito nas formas leves com antibióticoterapia oral.

QUESTÃO 23

São afirmativas corretas em relação à sinusite bacteriana aguda, **EXCETO**:

- a) Em crianças maiores, as radiografias de RX de seios da face devem ser feitas em duas incidências.
- b) São elementos essenciais no diagnóstico: presença de tosse ou secreção por mais de 10 dias, sem melhora, febre, secreção nasal purulenta por mais de quatro dias consecutivos.
- c) A tomografia computadorizada sem contraste é mais confiável para o diagnóstico.
- d) Dentre as complicações, pode-se citar a celulite periorbitária, abscesso, trombose de seio cavernoso, meningite, empiema subdural.
- e) Nas sinusites de repetição, devem-se pesquisar causas associadas.

QUESTÃO 24

São causas de diarreia persistente, **EXCETO**:

- a) Colagenoses.
- b) Deficiência de lactase.
- c) Desmame tardio.
- d) Fibrose cística.
- e) Giardia lamblia.

QUESTÃO 25

São manifestações clínicas do diabetes mellitus tipo 1, **EXCETO**:

- a) Perda de peso.
- b) Polidipsia.
- c) Dor abdominal.
- d) Hipofagia.
- e) Polifagia.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais, inclusive de saúde, impuseram importantes transformações na prática médica.”

Extraída do *abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública*, 1999.