

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
---	------------------------------

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crista da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cirurgia Plástica

QUESTÃO 21

Sobre as fraturas de ossos da face, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) As quedas e projéteis de arma de fogo são as causas mais comuns.
- b) A fratura mais comum é da mandíbula.
- c) Na fratura nasal, o hematoma deve ser drenado.
- d) A fratura do assoalho da órbita é a mais comum associada à fratura do malar.

QUESTÃO 22

Sobre as lesões de mão, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- a) A reparação de nervo pode ser feita após 6 meses.
- b) Nos ferimentos de pulso devemos reparar imediatamente as estruturas, principalmente as profundas.
- c) A lesão do nervo ulnar acarreta a mão em garra.
- d) A lesão do nervo radial acarreta punho caído.

QUESTÃO 23

Qual dose é adotada como limite de lidocaína nos bloqueios anestésicos?

- a) 1 a 2 mg/kg.
- b) 3 a 5 mg/kg.
- c) 7 a 10 mg/kg.
- d) 12 a 15 mg/kg.

QUESTÃO 24

Nas reconstruções de perdas cutâneas no nível dos dedos das mãos, pode ser utilizado o retalho de Moberg, que consiste em:

- a) Retalho de avançamento utilizado para perda da ponta do polegar.
- b) Retalho em ilha para reconstruir parte de um dedo.
- c) Retalho dorsal também utilizado em sindactilias.
- d) Retalho em V-Y utilizado para lesões proximais e espaço interdigital.

QUESTÃO 25

Dentre os inúmeros procedimentos de movimentação de retalhos, temos a zetaplastia. A esse respeito, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A plástica em Z consiste na confecção de dois retalhos em V que se transpõem, fazendo com que haja um alongamento da linha que contém a incisão comum aos retalhos.
- b) É muito utilizada onde a “extensão” da área resolva possíveis retrações ou defeitos oriundos da falta de tecido local.
- c) Na plástica em Z, temos como ganho o alongamento realizado a partir da linha que passa sobre a área a ser alongada.
- d) Com ângulo de 30 graus dessa linha, haverá o ganho máximo em alongamento.

QUESTÃO 26

Qual dos seguintes retalhos (livres) microcirúrgicos, utilizado para cobertura de perdas cutâneas dos membros inferiores, foi descrito na China?

- a) Retalho escapular.
- b) Retalho paraescapular.
- c) Retalho antebraquial radial.
- d) Retalho de grande dorsal.

QUESTÃO 27

Em relação a um reimplante de mão, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Geralmente a seqüência de reconstrução começa com o reparo das estruturas maiores e mais profundas.
- b) O procedimento microcirúrgico, propriamente dito, é realizado por último.
- c) Uma artéria e uma veia com anastomoses bem feitas são suficientes para a sobrevivência do coto de amputação.
- d) O polegar severamente lesado por avulsão não deve ser reimplatando.

QUESTÃO 28

Assinale a técnica utilizada para o fechamento de escaras trocanterianas:

- a) Retalho miocutâneo de tensor da fáscia lata
- b) Retalho miocutâneo de bíceps femoral.
- c) Retalho lombossacro transverso.
- d) Retalho miocutâneo em V-Y de glúteo máximo.

QUESTÃO 29

Qual a artéria responsável por cerca de 60% da vascularização da mama?

- a) Artéria torácica lateral.
- b) Ramos perfurantes intercostais posteriores.
- c) Artéria torácica interna.
- d) Artéria tóraco-acromial.

QUESTÃO 30

As regras de conduta para uma adequada relação entre os seres humanos e dos seres humanos com a comunidade, consideradas, entretanto, para determinadas épocas, determinadas culturas e determinadas regiões, denominam-se:

- a) Moral.
- b) Ética.
- c) Deontologia.
- d) Bioética.

QUESTÃO 31

Sobre a conduta e a técnica dos procedimentos microcirúrgicos, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Quando há uma falha entre os vasos doadores e receptores, uma ponte vascular pode ser interposta.
- b) Por ser um exame acurado, a arteriografia é necessária para uma boa avaliação pré-operatória.
- c) O exame físico e o conhecimento anatômico continuam sendo os melhores instrumentos na avaliação pré-operatória.
- d) Na cabeça e no pescoço há boa disponibilidade de vasos receptores para anastomoses terminotermiais.

QUESTÃO 32

As lesões nervosas para efeito de tratamento microcirúrgico foram classificadas por Sunderland. Em qual situação a lesão nervosa não apresenta uma recuperação espontânea?

- a) Lesão em que não há modificação estrutural, apenas interrupção da condução neural.
- b) Lesão restrita ao axônio.
- c) Lesão que atinge o perineuro e constitui um neuroma.
- d) Lesão do endoneuro.

QUESTÃO 33

A transferência de um dedo para a função do polegar é denominada:

- a) Centralização.
- b) Radialização
- c) Policização.
- d) Medialização.

QUESTÃO 34

Em enxertos de pele total até o 3º dia, nota-se a presença de capilares dilatados, em evidência de fluxo sanguíneo. No 4º dia há uma substituição por pequenos vasos com fluxo rápido. Esses vasos persistem nos enxertos maduros autógenos. Nos enxertos homogêneos e heterogêneos, esse fluxo cessa por volta do:

- a) 5º dia.
- b) 8º dia.
- c) 15º dia.
- d) 21º dia.

QUESTÃO 35

O nível mais comum da lesão do tendão flexor é a sua inserção distal. A lesão é conhecida como:

- a) Dedo em gatilho.
- b) Dedo em gota (queda do dedo).
- c) Dedo em martelo.
- d) Dedo em botoeira.

QUESTÃO 36

Na profilaxia da trombose venosa profunda, existem métodos físicos e farmacológicos, ou medicamentos, que devem ser utilizados para evitar o seu aparecimento. Dentre os métodos físicos descritos abaixo, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) O uso de meias elásticas é recomendável no pós-operatório. São meias de compressão graduada, que o paciente deve acostumar-se a vestir no pré-operatório e usar por 30 dias.
- b) No pós-operatório, o paciente deve assumir a posição de Fowler no leito.
- c) Deve adotar a elevação dos membros inferiores no leito (Trendelenburg) no pós-operatório, em torno de 20 a 30 graus de elevação.
- d) A deambulação deve ser encorajada e os benefícios explicados ao paciente.

QUESTÃO 37

Quanto à hidratação do queimado com o uso de fórmula de Parkland, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A fórmula obedece aos seguintes parâmetros para as primeiras 24 horas: 4ml de líquidos a serem infundidos (Ringer lactato isotônico) X peso corporal em kg X superfície corporal em porcentagem, até um máximo de 50%.
- b) Se as lesões tiverem uma superfície superior a 50%, esse valor permanece fixo nesse número, pois a capacidade de “seqüestro” de líquidos por parte do paciente não se torna maior com queimados acima de 50%.
- c) A solução hipertônica com lactato de Ringer deve ser reservada para pacientes chocados ou com superfície corporal queimada acima de 40%, independentemente de choque e/ou lesão pulmonar pelo trauma.
- d) Do total calculado para as primeiras 24 horas, um terço deve ser administrado nas primeiras horas.

QUESTÃO 38

Sobre a histopatologia do melanoma cutâneo, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- a) O diagnóstico microscópico não requer a identificação de melanócitos malignos.
- b) A classificação histopatológica não leva em consideração o local de aparecimento do tumor.
- c) O melanoma *in situ* ocorre quando a lesão ultrapassa a camada basal.
- d) As lesões invasivas apresentam dois padrões de progressão: horizontal (crescimento epidérmico) e vertical (expansão nodular).

QUESTÃO 39

Qual tumor de origem vascular aparece, devido à ectasia de capilares na derme, por malformação de suas paredes? Clinicamente, caracteriza-se por mancha de coloração avermelhada escura, bem delineada e de tamanhos variáveis. Histologicamente, é constituído por vasos aumentados em número e dilatados na porção superior do derma reticular.

- a) Hemangioma tuberoso.
- b) Hemangioma cavernoso.
- c) Hemangioma plano.
- d) Hemangioma de Rubi.

QUESTÃO 40

Para a ressecção de um carcinoma espinocelular com alto risco de recidiva, qual devem ser as margens cirúrgicas do tumor?

- a) 10 mm.
- b) 4 mm.
- c) 8 mm.
- d) 6 mm.

QUESTÃO 41

Qual tumor benígno de origem mesenquimal é mais comum?

- a) Tumor desmoide.
- b) Leiomioma.
- c) Angioma.
- d) Lipoma.

QUESTÃO 42

Qual queimadura provoca o tipo de cicatrização com as seguintes características?

“Quando se repara por meio de tecido conjuntivo, a cicatrização é feita a partir das bordas da lesão, pois surge o tecido de granulação, que é rico em miofibroblastos e provoca a retração da ferida”.

- a) Queimadura de 1º grau.
- b) Queimadura de 3º grau.
- c) Queimadura de 2º grau superficial.
- d) Queimadura de 2º grau profunda.

QUESTÃO 43

Sobre o emprego de aloenxertos no tratamento de queimaduras, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Com a revascularização do aloenxerto, diminuem objetivamente os índices de contaminação bacteriana local, assegurando um leito estéril para a posterior autoenxertia.
- b) A presença do aloenxerto sinaliza ao leito subjacente que ocorreu a oclusão da ferida, com diminuição da resposta inflamatória.
- c) Com o reconhecimento do enxerto alógeno como não-próprio, desencadeia-se processo inflamatório de rejeição com vasodilatação, diminuição do fluxo, trombose vascular e, finalmente, morte do enxerto.
- d) Após a morte do aloenxerto, não se pode proceder à auto-enxertia de pele.

QUESTÃO 44

Qual desses anestésicos locais é o menos tóxico?

- a) Lidocaína.
- b) Ropivacaína.
- c) Bupivacaína.
- d) Prilocaína.

QUESTÃO 45

Sobre a fascíte necrotizante, uma denominação que engloba infecções de partes moles, sobretudo da fáscia, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Agente infeccioso é múltiplo, com prevalência para o *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*.
- b) O quadro clínico se inicia com edema, eritema, calor local, acompanhado de dor.
- c) A evolução é para quadro de septicemia e choque.
- d) A extensa área cruenta favorece o desenvolvimento da infecção; por isso, a cirurgia reparadora reconstrutiva deve ser quase que imediata.

QUESTÃO 46

Sobre a fisiopatologia das queimaduras, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Autores consideram o aumento da permeabilidade capilar como o principal mecanismo fisiopatológico ocasionado pela ação direta da lesão térmica sobre a microcirculação.
- b) O aumento da permeabilidade capilar inicia-se alguns segundos após o trauma e dura, em média, de 18 a 24 horas.
- c) Durante as primeiras 6 a 8 horas do trauma térmico, o extravasamento de líquido para o interstício é mais rápido e dura entre 24 a 36 horas, aumentando progressivamente o edema local.
- d) Nas queimaduras pequenas, a formação máxima de edema acontece mais tardiamente que nas queimaduras maiores.

QUESTÃO 47

Na cicatrização das feridas, todos os itens abaixo podem influenciar na síntese do colágeno, **EXCETO**:

- a) Vitamina C.
- b) Infecção.
- c) Oxigenação.
- d) Diabetes.

QUESTÃO 48

A respeito das infecções em queimados, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A infecção é a principal complicação do queimado.
- b) As feridas infectadas têm tempo de cicatrização mais prolongado.
- c) A queimadura é uma indicação para o uso de antibióticos profiláticos.
- d) O uso indiscriminado de antimicrobianos sistêmicos aumenta o risco de doenças oportunistas.

QUESTÃO 49

Sobre a antibioticoterapia profilática, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Para que o agente antimicrobiano possa agir, é necessário que a bactéria seja suscetível ao agente empregado.
- b) O antimicrobiano deve estar presente em altas concentrações nos tecidos manipulados ao longo de todo o procedimento.
- c) Antimicrobianos administrados nos dias anteriores à cirurgia podem modificar a microbiota do paciente, selecionando microrganismos resistentes.
- d) O uso de antibióticos no pós-operatório tem impacto sobre a redução das taxas de infecção.

QUESTÃO 50

Sobre as queimaduras por agentes não-térmicos, assinale a afirmativa **VERDADEIRA**:

- a) As queimaduras pela radiação têm características evolutivas semelhantes às das queimaduras químicas.
- b) As lesões por radioterapia são raras.
- c) As feridas cutâneas após radioterapia podem-se complicar pelo processo inflamatório local, que pode ser intenso, resultando em perda da barreira cutânea e invasão de bactérias.
- d) As queimaduras químicas, independentemente de seu mecanismo de ação, geralmente não causam lesões de espessura total da pele.

QUESTÃO 51

Sobre as características de uma queimadura elétrica, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Os efeitos térmicos do trauma elétrico agudo, em nível celular, apresentam-se de modo diverso quando se consideram os diferentes tecidos do corpo.
- b) A transferência da energia térmica ocorre ao acaso e em todas as direções, mas a energia elétrica tem distribuição vetorial, na direção da corrente.
- c) Estudos recentes sugerem que a mudança e o aumento da temperatura sejam menores nos músculos, em seguida nos ossos e vasos.
- d) O dano histopatológico é mais significativo na extremidade que faz o *terra*.

QUESTÃO 52

Ainda sobre o procedimento de anestesia infiltrativa, assinale agora a afirmativa **VERDADEIRA**:

- a) A toxicidade dos anestésicos locais se expressa principalmente por meio de náuseas e vômitos.
- b) Os efeitos no sistema nervoso central só ocorrem quando a concentração plasmática do anestésico local atingir 15mcg/ml.
- c) Estes efeitos, quando presentes, incluem: dormência perioral, parestesia da língua, confusão, inquietação, sonolência, fala conturbada, gosto metálico na boca, inconsciência e convulsão.
- d) As injeções venosas acidentais de ropivacaína levam ao colapso circulatório com sinais de cardiotoxicidade.

QUESTÃO 53

Em um efeito de toda a espessura do lábio superior, compreendido entre um terço e dois terços de comprimento, no meio do lábio, qual seria o melhor retalho indicado para a sua reconstrução?

- a) Retalho de Estlander.
- b) Retalho em V-Y em avançamento.
- c) Retalho de Abbé.
- d) Retalho de língua.

QUESTÃO 54

As infecções por micobactérias não-tuberculosas são um problema emergente na cirurgia plástica. Com relação à infecção de implantes mamários por essas micobactérias, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A contaminação de soluções ou de água é freqüentemente associada à ocorrência desses eventos epidemiológicos.
- b) No surto recente, investigado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, o microrganismo mais envolvido foi a *Mycobacterium fortuitum*.
- c) O tratamento de infecções por micobactérias atípicas não inclui a remoção de implantes.
- d) Os antimicrobianos utilizados no tratamento dessa infecção são claritromicina, ciprofloxacina e amicacina.

QUESTÃO 55

Assinale o sinal que pode ser específico de fratura do assoalho da órbita:

- a) Encurtamento da pálpebra inferior.
- b) Equimose palpebral.
- c) Edema palpebral.
- d) Sangramento conjuntival.

QUESTÃO 56

Qual o tipo de intubação para uma cirurgia craniofacial com exposição do terço médio da face e com bloqueio intermaxilar, como suporte de assistência ventilatória limitada ao ato cirúrgico?

- a) Orotraqueal.
- b) Nasotraqueal.
- c) Submandibular.
- d) Traqueostomia.

QUESTÃO 57

Qual o tipo de nevo que tem as seguintes características: lesão constituída por melanócitos presentes na derme; em geral, lesão única, nodular, circunscrita, pequena e localizada, na maioria das vezes, no dorso das mãos ou dos pés, com transformação maligna considerada excepcional?

- a) Nevo composto.
- b) Nevo azul.
- c) Nevo juvenil.
- d) Lentigo.

QUESTÃO 58

A escara por decúbito e pressão tem como etiologia principal:

- a) Bloqueio venoso da região.
- b) Compressão parcial de pedículo vascular de retalhos microcirúrgicos.
- c) Isquemia.
- d) Ligadura inadvertida de vaso a distância.

QUESTÃO 59

Qual a complicação mais comum nas reconstruções mamárias com o emprego de retalho miocutâneo do músculo grande dorsal?

- a) Seroma.
- b) Hematoma.
- c) Infecção.
- d) Necrose parcial do retalho.

QUESTÃO 60

Com relação ao retalho bipediculado transversal do músculo reto abdominal, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A mais correta indicação para o uso do retalho TRAM pediculado em ambos os vasos epigástricos superiores, com a elevação de ambos os músculos retos do abdome, é a necessidade de utilização plena de todo o retalho abdominal.
- b) A retirada dos dois retos abdominais causa um severo desfalque à integridade da parede abdominal pela perda de ambos os retos.
- c) O transtorno à fisiologia da parede abdominal pode ser traduzido por dor e incapacidade para prática de exercícios físicos.
- d) Esse enfraquecimento da parede faz com que as hérnias incisionais pós-operatórias sejam muito freqüentes.

QUESTÃO 61

De acordo com o padrão de crescimento do melanoma maligno, assinale as características do melanoma disseminativo superficial:

- a) Ocorre geralmente em face palmar e plantar.
- b) Corresponde de 4% a 10% de todos os melanomas, e ocorre metástase com menor freqüência.
- c) É o mais freqüente dos melanomas malignos, correspondendo a aproximadamente a 70% dos casos.
- d) Clinicamente, caracteriza-se como uma lesão enegrecida de coloração mais uniforme e elevada.

QUESTÃO 62

No tratamento imediato do grande queimado, qual item deve ser evitado?

- a) Analgesia.
- b) Acesso venoso.
- c) Resfriamento da lesão.
- d) Uso de tranqüilizantes.

QUESTÃO 63

A respeito dos enxertos ósseos, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) O osso membranoso forma-se a partir de um tecido mesenquimal preexistente. É formada, assim, a maioria dos ossos da face e do crânio.
- b) A partir da terceira semana de enxertia, o osso cortical se revasculariza mais rapidamente que o medular, pela facilidade de penetração dos brotos vasculares no primeiro.
- c) O osso medular repara-se completamente por novo osso.
- d) Clinicamente, confirma-se o descrito da fisiologia, em que o uso de ossos membranosos supera, pela sua facilidade de integração, o enxerto de osso endocondral.

QUESTÃO 64

Para um tumor espinocelular, todos os seguintes fatores clínicos são considerados de alto risco, **EXCETO**:

- a) Bordas do tumor mal delimitadas.
- b) Lesão recidivada.
- c) Crescimento rápido.
- d) Sem história de radioterapia prévia.

QUESTÃO 65

Sobre o carcinoma basocelular, sua apresentação clínica e suas variantes, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Na sua forma nodular, pode apresentar pigmento melânico em diversas concentrações, caracterizando o Ca. Basocelular pigmentado, que pode ser confundido com o melanoma cutâneo.
- b) Na variante superficial multicêntrica ou multifocal, o Ca. Basocelular é comumente encontrado no tronco e nas extremidades.
- c) Na variante infiltrativa, as lesões podem ter consistência fibrosa ou inelástica; são lesões ligeiramente elevadas ou planas, e, são pouco agressivas e pouco destrutivas, com baixa taxa de recorrência.
- d) O Ca. Basocelular esclerodermiforme leva esse nome pela sua semelhança com lesões localizadas de esclerodermia.

QUESTÃO 66

A cobertura cutânea da mão tem suas particularidades. Sobre esta cobertura cutânea, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A drenagem venosa e linfática é realizada principalmente pelo dorso da mão.
- b) A pele palmar apresenta uma camada córnea bem desenvolvida, com número elevado de glândulas sudoríparas.
- c) A pele palmar tem uma capacidade regenerativa-cicatrizial excelente.
- d) As incisões cirúrgicas na região palmar devem ser lineares e longitudinais às pregas das flexões digitopalmares.

QUESTÃO 67

Com relação à formação de uma escara de decúbito, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Uma pessoa gorda, tendo mais tecido adiposo, está mais protegida contra o aparecimento de escara de decúbito.
- b) Todos os pontos do esqueleto ósseo que se projetam, por serem mais ou menos superficiais, podem favorecer a ação da pressão e criar área de isquemia.
- c) Normalmente, por efeitos físicos, a distribuição da pressão tem a forma cônica, cuja base é profunda e o vértice superficial.
- d) Durante o período de delimitação e expulsão do material necrosado, o organismo desenvolve, em defesa e isolamento do problema, espessa camada de tecido fibroso.

QUESTÃO 68

Sobre a anestesia local e o emprego de anestésicos locais em cirurgia, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Os anestésicos cuja ligação entre o radical aromático e a porção intermediária é do tipo amida são classificados como aminoamidas.
- b) As aminoamidas abrangem a lidocaína, etidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína e ropivacaína.
- c) A procaína e a benzocaína são classificadas como aminoésteres.
- d) Atualmente, a lidocaína e a procaína são os anestésicos locais menos utilizados na anestesia infiltrativa.

QUESTÃO 69

A incidência de infecção em sítio cirúrgico varia de acordo com a classificação da ferida cirúrgica. Assinale o **índice de infecção esperado** em uma cirurgia limpa:

- a) 0% a 0,5%.
- b) 1% a 5%.
- c) 5,5% a 7,5%.
- d) 7,5% a 10%.

QUESTÃO 70

Uma lesão pigmentada pode levantar a suspeita clínica de melanoma cutâneo quando apresentar as seguintes características, **EXCETO**:

- a) Assimetria de contorno e coloração.
- b) Bordos irregulares.
- c) Coloração variada na mesma lesão.
- d) Diâmetro geralmente menor que 6 mm.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.