

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crista da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Dermatologia

QUESTÃO 21

A desmogleína 3 é uma proteína localizada:

- a) Nos desmossomas das camadas suprabasais da epiderme.
- b) Na camada granulosa da epiderme.
- c) Na lâmina lúcida da zona da membrana basal.
- d) Na lâmina densa da zona da membrana basal.

QUESTÃO 22

Que tipo de colágeno é o principal componente das fibrilas de ancoragem do complexo de adesão hemidesmossômico?

- a) Colágeno tipo IV.
- b) Colágeno tipo V.
- c) Colágeno tipo VII.
- d) Colágeno tipo I.

QUESTÃO 23

No penfigóide bolhoso ocorre uma reação imune do tipo:

- a) Tipo IV (hipersensibilidade tardia).
- b) Tipo II (citólítica ou citotóxica).
- c) Tipo III (de complexos antígeno-anticorpos solúveis)
- d) Tipo I (anafilática).

QUESTÃO 24

São alterações ungueais secundárias ao acometimento do leito ungueal pela psoríase, **EXCETO**:

- a) Hiperqueratose subungueal.
- b) Mancha salmão.
- c) Onicólise.
- d) Depressões gotadas, cupuliformes (unhas em dedal).

QUESTÃO 25

Qual é a apresentação clínica mais comum do líquen plano oral (LPO)?

- a) LPO erosivo.
- b) LPO atrófico.
- c) LPO papular.
- d) LPO reticular.

QUESTÃO 26

Assinale a questão **CORRETA** em relação ao tratamento da psoríase:

- a) Os medicamentos biológicos antilinfocitários (alefacept e efalizumab) não atuam no quadro artropático da psoríase.
- b) O uso de ciclosporina A não pode ser considerado na gravidez, já que ela é teratogênica.
- c) O uso de metotrexate pode ser considerado na gravidez, já que ele não é teratogênico e não é tóxico para o feto.
- d) O método de Goeckerman é a associação do coaltar com a radiação ultravioleta A.

QUESTÃO 27

Quais são os efeitos colaterais mais comuns em pacientes usando ciclosporina por curtos períodos de tempo?

- a) Nefrotóxicos.
- b) Neurológicos, incluindo tremores, cefaléia, parestesia e/ou hiperestesia.
- c) Gastrintestinais: náuseas, vômitos, diarreia.
- d) Alterações tromboembólicas.

QUESTÃO 28

A imunofluorescência indireta é positiva na maioria dos pacientes com as seguintes dermatoses, **EXCETO**:

- a) Pênfigo foliáceo.
- b) Pênfigo vulgar.
- c) Dermatite herpetiforme.
- d) Penfigóide bolhoso.

QUESTÃO 29

Todas as questões estão corretas em relação à classificação dos agentes biológicos, **EXCETO**:

- a) Infliximab: anticorpo monoclonal quimérico.
- b) Adalimumab: anticorpo monoclonal humano.
- c) Alefacept: anticorpo monoclonal humanizado.
- d) Etanercept: proteína de fusão.

QUESTÃO 30

Todas as questões estão corretas em relação à psoríase, **EXCETO**:

- a) Nas lesões psoriáticas há um predomínio de citocinas produzidas pelas células Th2 em relação às produzidas pelas células Th1.
- b) Na psoríase, o número de células de Langerhans está caracteristicamente diminuído.
- c) As células T CD8+ compreendem a maioria das células T que invadem a epiderme da lesão psoriática.
- d) Na lesão psoriática há um aumento de múltiplas classes de proteinases.

QUESTÃO 31

Assinale a questão **CORRETA** em relação à classificação da pitiríase rubra pilar proposta por Griffiths:

- a) A forma clássica do adulto (tipo I) é o subtipo mais comum e geralmente progride para uma eritrodermia com ilhas de pele normal.
- b) A forma atípica do adulto (tipo II) geralmente não evolui para eritrodermia e na maioria das vezes tem resolução completa em poucos anos.
- c) A forma clássica juvenil (tipo III) geralmente se inicia na adolescência e tem longa duração.
- d) A forma atípica juvenil (tipo V) geralmente se inicia na adolescência e na maioria das vezes tem distribuição localizada e curto tempo de duração (1 a 2 anos).

QUESTÃO 32

Qual a infecção fúngica oportunística mais comum em pacientes imunossuprimidos?

- a) Aspergilose.
- b) Candidíase.
- c) Criptococose.
- d) Histoplasmose.

QUESTÃO 33

Todas as questões estão corretas em relação à síndrome de Sweet, **EXCETO**:

- a) As lesões cutâneas típicas são placas e nódulos eritematosos, edematosos, dolorosos.
- b) Pode ocorrer o fenômeno de patergia.
- c) As manifestações extra-cutâneas da síndrome de Sweet geralmente são resistentes ao tratamento com corticosteróide oral.
- d) Úlceras da mucosa oral na síndrome de Sweet ocorrem mais freqüentemente em pacientes com desordens hematológicas associadas e são incomuns em pacientes com a síndrome de Sweet clássica.

QUESTÃO 34

Todas as questões estão corretas em relação ao granuloma facial, **EXCETO**:

- a) Geralmente se manifesta como uma lesão facial única, assintomática.
- b) O exame histopatológico revela vasculite leucocitoclásica e infiltrado com plasmócitos, linfócitos, histiócitos, neutrófilos e eosinófilos.
- c) Ocorre principalmente em adultos.
- d) A fibrose angiocêntrica eosinofílica é uma variante rara que envolve a mucosa ocular

QUESTÃO 35

São medicamentos com risco significativo de causarem síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, **EXCETO**:

- a) Furosemida.
- b) Alopurinol.
- c) Sulfametoxazol.
- d) Lamotrigina.

QUESTÃO 36

Todos os seguintes agentes responsáveis pela tinha do couro cabeludo causam fluorescência à luz de Wood, **EXCETO**:

- a) *Trichophyton schoenleinii*.
- b) *Microsporum canis*.
- c) *Trichophyton violaceum*.
- d) *Microsporum audouini*.

QUESTÃO 37

Qual a forma mais comum de erupção cutânea a drogas?

- a) Erupção exantematosa.
- b) Urticária.
- c) Erupção pustular.
- d) Eritema pigmentar fixo.

QUESTÃO 38

São medicamentos causadores da síndrome de hipersensibilidade a drogas, **EXCETO**:

- a) Lamotrigina.
- b) Ácido valpróico.
- c) Carbamazepina.
- d) Minociclina.

QUESTÃO 39

Todas as questões estão corretas em relação à hiperqueratose epidermolítica, **EXCETO**:

- a) É doença hereditária autossômica dominante.
- b) A doença habitualmente já se manifesta ao nascimento.
- c) Os doentes podem apresentar acometimento cutâneo generalizado ou localizado.
- d) A histopatologia não é característica, sendo semelhante a outras formas de ictiose.

QUESTÃO 40

São tipos de queratodermias palmo-plantares com acometimento cutâneo exclusivo, **EXCETO**:

- a) Tipo Unna-Thost.
- b) Tipo Greither.
- c) Tipo Vohwinkel.
- d) Tipo Vorner.

QUESTÃO 41

São desordens que podem apresentar acantólise ao exame histopatológico, **EXCETO**:

- a) Doença de Darier-White.
- b) Acroqueratose verruciforme.
- c) Doença de Grover.
- d) Pênfigo foliáceo.

QUESTÃO 42

Assinale a questão **CORRETA** em relação à Doença de Darier:

- a) É causada por mutações no gene ATP2A2.
- b) Piora com o frio e melhora com o calor.
- c) As unhas raramente são afetadas na Doença de Darier.
- d) A maioria dos pacientes desenvolvem as lesões cutâneas nos primeiros 3 anos de vida.

QUESTÃO 43

Qual é o tipo mais comum de poroqueratose?

- a) Poroqueratose de Mibelli.
- b) Poroqueratose linear.
- c) Poroqueratose palmo-plantar e disseminada.
- d) Poroqueratose actínica superficial disseminada.

QUESTÃO 44

São doenças que cursam com bolhas subepidérmicas, **EXCETO**:

- a) Herpes gestacional.
- b) Epidermólise bolhosa simples.
- c) Epidermólise bolhosa adquirida.
- d) Dermatose por IgA linear.

QUESTÃO 45

É uma forma de paniculite predominantemente septal:

- a) Paniculite pós-corticoterapia.
- b) Paniculite lúpica.
- c) Eritema nodoso.
- d) Esclerema neonatal.

QUESTÃO 46

Todas as alternativas estão corretas em relação à rosácea, **EXCETO**:

- a) Não há correlação entre a gravidade da rosácea cutânea e ocular.
- b) Geralmente a rosácea inicia-se terceira e quarta décadas. Porém, crianças, adolescentes e adultos mais jovens também podem desenvolver rosácea.
- c) A rosácea pode afetar todas as raças.
- d) O rinofima, apesar de ser bem mais freqüente em homens, pode ocorrer também nas mulheres

QUESTÃO 47

Todas as questões estão corretas em relação aos subtipos de melanoma, **EXCETO**:

- a) Todos os melanomas palmares e plantares são melanomas lentiginosos acrais.
- b) O melanoma extensivo superficial é o subtipo de melanoma mais comumente associado com um nevo melanocítico pré-existente.
- c) O melanoma nodular é o segundo subtipo mais comum de melanoma.
- d) A incidência de melanoma lentiginoso acral é similar nos caucasianos e em outras etnias.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação aos fatores prognósticos do melanoma:

- a) A presença ou não de ulceração é um fator prognóstico independente para o melanoma localizado.
- b) A medida do tumor feita pelo nível de Clark é o mais importante fator determinante do prognóstico no melanoma localizado.
- c) Em geral o homem tem melhor prognóstico que a mulher.
- d) A presença de um infiltrado inflamatório no exame histopatológico indica um pior prognóstico.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação à terapia fotodinâmica em dermatologia:

- a) Em dermatologia, as principais drogas usadas na terapia fotodinâmica são: 5-ALA (ácido 5 delta aminolevulínico), o seu metil ester (MAL) e o porfímero sódio (Photofrin).
- b) A terapia fotodinâmica tem eficácia alta para lesões como ceratoses actínicas, carcinomas basocelulares superficiais e carcinomas basocelulares pigmentados.
- c) Os efeitos induzidos pela terapia fotodinâmica são mediados por reações fotooxidativas.
- d) A eficácia da terapia fotodinâmica não é aumentada por sessões repetidas do tratamento.

QUESTÃO 50

Todas as alternativas estão corretas em relação à classificação atual da síndrome de Ehlers-Danlos, **EXCETO**:

- a) O tipo com hiper mobilidade cursa com hiper mobilidade articular generalizada, dor músculo-esquelética proeminente, luxações e subluxações. Escoliose e pé plano são comuns.
- b) O tipo cifo escoliótico é de transmissão autossômica dominante e cursa com hipotonia muscular grave e cifo escoliose progressiva, já presentes ao nascimento. A intensidade do quadro cutâneo é semelhante à vista no tipo clássico.
- c) O tipo vascular é de transmissão autossômica dominante e é a forma mais grave, podendo ocorrer rupturas arteriais e viscerais.
- d) O tipo dermatosparaxis cursa com redundância e fragilidade intensa da pele. Pode haver ruptura prematura de membranas fetais e hérnias inguinais e umbilicais.

QUESTÃO 51

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao xeroderma pigmentoso:

- a) A síndrome de Sanctis-Cacchione é uma forma mais leve da doença, com pouco acometimento sistêmico.
- b) As anormalidades oculares são bem menos comuns do que as anormalidades cutâneas e não são um achado importante nestes pacientes.
- c) Esta doença não é vista em pacientes melanodérmicos.
- d) A média de idade de início dos cânceres cutâneos não-melanoma nestes pacientes é 8 anos.

QUESTÃO 52

São doenças que frequentemente cursam com infecções piogênicas de repetição, **EXCETO**:

- a) Síndrome de Chédiak-Higashi.
- b) Ataxia-telangiectasia.
- c) Síndrome de Rothman-Thomson.
- d) Síndrome de Wiskott-Aldrich.

QUESTÃO 53

Qual das doenças citadas abaixo é um linfoma cutâneo primário?

- a) Hiperplasia linfóide cutânea.
- b) Doença de Kimura.
- c) Infiltração linfocítica da pele.
- d) Reticulose pagetóide.

QUESTÃO 54

Qual doença tem como marcador diagnóstico à imunohistoquímica a positividade de S-100, CD1A e CD207?

- a) Histiocitose de células de Langerhans.
- b) Melanoma atípico de células fusiformes.
- c) Carcinoma de células de Merkel.
- d) Micose fungóide.

QUESTÃO 55

Qual a coloração usada no exame histopatológico para detecção de mucopolissacarídeos ácidos?

- a) Azul toluidina.
- b) Ácido periódico Schiff.
- c) Verhoef.
- d) Orceína-Giemsa.

QUESTÃO 56

Todas as questões estão corretas em relação ao lúpus eritematoso cutâneo subagudo, **EXCETO**:

- a) As lesões cutâneas geralmente ocorrem na porção superior do tronco, ombros, V do decote, face extensora dos membros superiores e dorso das mãos. Lesões em face são menos comuns.
- b) As lesões cutâneas geralmente envolvem com hipocromia ou acromia residual, mas sem atrofia.
- c) Esta doença tem associação significativa com antígenos de histocompatibilidade HLA-B8 e HLA-DR3.
- d) Metade destes pacientes preenche os critérios para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e geralmente estes pacientes têm comprometimento sistêmico grave.

QUESTÃO 57

Qual é a lesão dermatológica mais comum nos pacientes com artrite reumatóide?

- a) Vasculite reumatóide.
- b) Nódulo reumatóide subcutâneo.
- c) Dermatose neutrofílica reumatóide.
- d) Eritema palmar.

QUESTÃO 58

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação à doença de Behçet:

- a) O diagnóstico desta doença é fundamentalmente clínico, já que não há exames laboratoriais patognomônicos.
- b) Atinge preferencialmente homens após os 50 anos.
- c) É considerada uma doença contagiosa, sendo bem relatados casos de transmissão horizontal desta doença.
- d) A colchicina é um dos medicamentos mais usados no tratamento das formas sistêmicas desta doença.

QUESTÃO 59

São afecções que têm como achado histopatológico característico a presença de granuloma em paliçada circundando áreas necrobióticas de tecido conectivo, **EXCETO**:

- a) Nódulo reumatóide.
- b) Granuloma anular.
- c) Sarcoidose.
- d) Nódulo sifilítico justa-articular.

QUESTÃO 60

A sicosse da barba é uma infecção causada por:

- a) Bactérias, habitualmente o estafilococo plasmó-coagulase positivo.
- b) Fungos dermatófitos.
- c) Bactérias, habitualmente a *Pseudomonas aeruginosa*.
- d) Micobactérias.

QUESTÃO 61

É um exemplo de tuberculose cutânea que ocorre através de disseminação endógena da micobactéria:

- a) Cancro tuberculoso.
- b) Lúpus vulgar.
- c) Tuberculose verrucosa cútis.
- d) Lúpus pérvio.

QUESTÃO 62

Todas as questões estão corretas em relação à hanseníase, **EXCETO**:

- a) A ocorrência de necrose caseosa nos nervos é uma característica da hanseníase tuberculóide.
- b) O fenômeno de Lúcio é uma vasculite leucocitoclástica que ocorre na lepra de Lúcio pelo comprometimento do endotélio vascular por bacilos íntegros.
- c) Em um paciente com eritema nodoso de etiologia indefinida, o teste de Mitsuda positivo exclui a hanseníase como causa do eritema nodoso.
- d) O bacilo de Hansen é um germe de baixa infectividade e baixa patogenicidade.

QUESTÃO 63

Todas as questões estão corretas em relação aos retinóides orais, **EXCETO**:

- a) Efeitos tóxicos agudos causados pelos retinóides incluem lesões mucocutâneas e alterações ósseas.
- b) Retinóides afetam o crescimento e a diferenciação celular, exercem ação imunomoduladora e alteram a adesividade celular.
- c) O bexaroteno é um retinóide de terceira geração usado em algumas situações para o tratamento de linfomas cutâneos de células T.
- d) Cicatrização das lesões de acne mesmo depois da descontinuidade do tratamento com isotretinoína ocorre regularmente.

QUESTÃO 64

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação às doenças viróticas:

- a) A herpangina é um quadro de infecção herpética primária, mais comumente visto em crianças, causada geralmente pelo herpes vírus 1.
- b) A infecção humana primária pelo citomegalovírus em crianças e adultos imunocompetentes é usualmente assintomática.
- c) A maioria dos casos de exantema súbito é causada pelo herpes vírus 7 (HHV-7).
- d) O exantema do sarampo acomete o pescoço e tronco e habitualmente poupa as extremidades.

QUESTÃO 65

É uma infecção micótica:

- a) Tricomiose axilar.
- b) Botriomicose .
- c) Eritrasma.
- d) Zigomicose.

QUESTÃO 66

Qual é o principal agente causador do actinomicetoma endógeno?

- a) *Arachnia propionica*.
- b) *Nocardia brasiliensis*.
- c) *Actinomyces israelii*.
- d) *Strptomycetes somaliensis*.

QUESTÃO 67

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao diagnóstico laboratorial da leishmaniose tegumentar:

- a) O exame de esfregaço (corado pelo Leishman ou Giemsa) é quase sempre positivo em lesões recentes e tardias.
- b) A reação de Montenegro é um método muito utilizado na complementação do diagnóstico. Ela é altamente específica e sensível, porém continua positiva após a cura da doença.
- c) A cultura do microorganismo é quase sempre positiva, por isto deve ser solicitada para o diagnóstico.
- d) Em relação à sorologia, a reação de fixação de complemento atualmente é o método sorológico mais utilizado, por ser muito sensível.

QUESTÃO 68

Todas as alternativas estão corretas em relação à escabiose, **EXCETO**:

- a) O tratamento da escabiose nodular é igual ao tratamento da escabiose comum.
- b) O benzoato de benzila, usado em loção a 25% para o tratamento da escabiose freqüentemente causa uma dermatite irritativa.
- c) Os contagiados por um indivíduo com sarna crostosa irão desenvolver escabiose comum.
- d) O parasita da escabiose completa todo o ciclo biológico no homem.

QUESTÃO 69

Todas as questões estão corretas em relação à sífilis, **EXCETO**:

- a) A lesão mais precoce da sífilis secundária é constituída por um exantema morbiliforme: é a roséola sífilítica.
- b) Os testes sorológicos antilipídicos não podem ser usados no seguimento pós-tratamento da sífilis.
- c) As ranhuras de Parrot são fissuras ou ragádias em torno das comissuras labiais e/ou do ânus e podem ocorrer na sífilis congênita tardia.
- d) Os testes sorológicos antitreponêmicos são considerados específicos, porém excepcionalmente podem ocorrer reações falso-positivas em indivíduos normais ou em doenças com globulinas anormais, no lúpus eritematoso sistêmico e em usuários de drogas.

QUESTÃO 70

A seguinte forma de ictiose ocorre devido à deficiência da esteróide sulfatase:

- a) Ictiose lamelar.
- b) Ictiose bolhosa de Siemens.
- c) Hiperqueratose epidermolítica.
- d) Ictiose recessiva ligada ao cromossomo X.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.