

CONCURSO PÚBLICO



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

CADERNO DE PROVAS

CADERNO 2	ESPECIALIDADES: CARDIOLOGIA (2 ANOS) PNEUMOLOGIA
PROVA:	<ul style="list-style-type: none">• CLÍNICA MÉDICA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de **50** (cinquenta) questões objetivas de Clínica Médica. Confira-o.
2. Esta prova terá, no máximo, **3h30** (três horas e trinta minutos) de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1** (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.



Prezado (a) candidato (a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE CLÍNICA MÉDICA – Cad. 2

QUESTÃO 01

No que diz respeito à Doença de Creutzfeldt – Jakob (DCJ), **NÃO** é correto afirmar:

- (A) A DCJ é um distúrbio que evolui com demência, mioclonias, rigidez e sinais corticais focais
- (B) Doenças priônicas como a DCJ são raras
- (C) Na DCJ não existe tratamento comprovado
- (D) Na DCJ, a morte usualmente ocorre 5 anos a partir do primeiro sintoma

QUESTÃO 02

Sobre a Doença de Crohn, é correto o que se afirma, **EXCETO** em:

- (A) A Doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até a região perianal.
- (B) A tomografia computadorizada pode mostrar alças intestinais espessadas.
- (C) Ciprofloxacino, Ácido 5- aminossalicílico, prednisona, metronidazol, adalimumabe são utilizadas na terapia medicamentosa.
- (D) São complicações frequentes da doença o megacolon tóxico e a perfuração colônica.

QUESTÃO 03

Em relação ao diagnóstico da Dengue, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A dor abdominal intensa e contínua, hipotensão postural e plaquetas abaixo de $50.000/\text{mm}^3$ são sintomas de gravidade do quadro clínico.
- (B) A prova do laço positiva é patognomônica da febre hemorrágica da dengue.
- (C) A sorologia para dengue (IgM e IgG) deve ser solicitada após o 12º dia da doença.
- (D) O hematócrito diminuído acima de 20% do valor normal ocorre na síndrome do choque da dengue.

QUESTÃO 04

Quanto à diarreia ou colite pseudomembranosa associada ao *Clostridium difficile*, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Alternativa terapêutica é representada por vancomicina endovenosa 2 g/dia por 14 dias.
- (B) A recorrência dos sintomas pode aparecer dentro de dias ou semanas após completado o tratamento.
- (C) Aminoglicosídeos, tetraciclina e cloranfenicol são antimicrobianos frequentemente associados à indução da colite por *Clostridium difficile*.
- (D) As fezes sempre exibem sangue macroscópico.

QUESTÃO 05

Em relação às diarreias agudas, é correto o que se afirma, **EXCETO** em:

- (A) A diarreia aguda é caracterizada pela eliminação diária de mais de 250g de fezes, geralmente por 2 a 3 dias consecutivos e menos que 2 a 3 semanas.
- (B) A principal causa de diarreia aguda nos adultos é infecciosa.
- (C) Os antibióticos devem ser usados como rotina na diarreia aguda.
- (D) Os antidiarreicos não estão indicados na maioria dos casos de diarreia aguda.

QUESTÃO 06

São fatores de risco associados à hipertensão arterial primária, **EXCETO**:

- (A) Deficiência de vitamina D.
- (B) Dislipidemias.
- (C) Obesidade.
- (D) Uso de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 07

São causas de neutrofilia adquirida, **EXCETO**:

- (A) Glicocorticoides.
- (B) Hiperesplenismo.
- (C) Síndrome de Down.
- (D) Tabagismo.

QUESTÃO 08

Para origem da hematúria, na presença de eritrócitos dismórficos no exame de urina, é **CORRETO** o item:

- (A) Glomerular.
- (B) Túbulo intersticial renal.
- (C) Uretral.
- (D) Vesical.

QUESTÃO 09

Sobre o tratamento antimicrobiano na peritonite bacteriana espontânea, analise as seguintes afirmativas:

- I. Pode-se iniciar o tratamento antibiótico empírico.
- II. A cultura do líquido ascítico pode ser negativa em 60% dos casos.
- III. A maioria dos germes são bactérias Gram-positivas.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 10

Sobre a Dengue, estão corretas as seguintes afirmativas, **EXCETO**:

- (A) Os principais vetores da dengue são os mosquitos *Aedes* das espécies *aegypti* e *albopictus*.
- (B) O único reservatório a participar no ciclo transmissor do vírus da dengue é o próprio homem.
- (C) É frequente o achado de eritema nodoso.
- (D) A leptospirose, malária e rickettsioses estão entre os diagnósticos diferenciais da dengue.

QUESTÃO 11

Com relação à Sífilis, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) A adenopatia pode persistir por muito tempo após a cicatrização do cancro.
- (B) A resposta ao tratamento, na fase inicial, deve ser monitorada sorologicamente a intervalos de 6 a 12 meses (e a 3 meses nas pessoas infectadas pelo HIV).
- (C) Os pacientes com sífilis devem ser avaliados para infecção pelo HIV.
- (D) Um teste FTA-ABS negativo não exclui a neurosífilis.

QUESTÃO 12

São doenças de transmissão respiratória, **EXCETO**:

- (A) Leptospirose.
- (B) Meningite Meningocócica.
- (C) Tuberculose.
- (D) Varicela.

QUESTÃO 13

Quanto aos antimicrobianos usados no tratamento para bactérias Gram-positivas multirresistentes, são **CORRETOS** os indicados em:

- (A) Aztreonam e Vancomicina.
- (B) Linezolida e Daptomicina.
- (C) Polimixin e Meropenem.
- (D) Voriconazol e Micafungina.

QUESTÃO 14

Sobre o tratamento das pneumonias comunitárias adquiridas – PAC, em adultos, analise as afirmativas:

- I. A associação de macrolídeo mais uma cefalosporina de 3ª geração é indicada no tratamento de pacientes hospitalizados com PAC.
- II. Doses maiores de levofloxacino (750mg/dia) podem diminuir o tempo de tratamento da PAC, com mais rápida resolução da febre.
- III. As fluorquinolonas e macrolídeos são causas de prolongamento do intervalo QT no ECG.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.

QUESTÃO 15

Quais os antimicrobianos de escolha no tratamento de pneumonia por *Klebsiella pneumoniae* produtora de ESBL?

- (A) Ceftriaxona e Cefepime.
- (B) Daptomicina e Teicoplanina.
- (C) Polimixina e Ertapenem.
- (D) Tigeciclina e Clindamicina.

QUESTÃO 16

São fatores de **pio**r prognóstico para sobrevivência no Lupus Eritematoso Sistêmico, **EXCETO**:

- (A) Glomerulonefrite difusa proliferativa.
- (B) Hipertensão arterial.
- (C) Presença de Anticorpo antifosfolípide.
- (D) Sexo feminino.

QUESTÃO 17

Considerando a hemorragia de úlcera péptica, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) A localização da úlcera não é fator de risco para sangramento recorrente.
- (B) A maioria dos pacientes com sangramento de úlcera péptica tem melhora espontânea.
- (C) A presença de vaso visível e coágulo aderido na úlcera são fatores de risco para sangramento recorrente.
- (D) Todos os pacientes com sangramento de úlcera péptica devem receber inibidor de bomba protônica.

QUESTÃO 18

Em relação aos achados de laboratório na pancreatite aguda, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Uma amilase sérica normal exclui o diagnóstico de pancreatite aguda.
- (B) O grau de elevação de amilase permite prever a gravidade da pancreatite.
- (C) Amilase sérica aumenta com 6 horas do início da pancreatite aguda e retorna ao normal com 3 a 5 dias.
- (D) Lipase sérica aumenta em 24 horas do início dos sintomas e retorna ao normal com 3 dias.

QUESTÃO 19

São causas de derrame pleural classificado como exsudato, **EXCETO**:

- (A) Infecção Viral.
- (B) Síndrome de Meig's.
- (C) Síndrome Nefrótica.
- (D) Uremia.

QUESTÃO 20

Sobre a Malária, **NÃO** é correto afirmar:

- (A) A icterícia na malária ocorre em geral na 2ª semana.
- (B) A malária pode ser doença grave e potencialmente letal.
- (C) Caracteriza-se por paroxismo febril que se inicia com calafrios.
- (D) É frequente a evolução para insuficiência hepática com dano hepático permanente.

QUESTÃO 21

São sintomas e sinais do hipertireoidismo, **EXCETO**:

- (A) Fraqueza muscular proximal.
- (B) Palpitações e labilidade emocional.
- (C) Pele seca e constipação.
- (D) Perda de peso.

QUESTÃO 22

São anormalidades hematológicas encontradas na anemia megaloblástica, **EXCETO**:

- (A) Contagem de reticulócitos elevada.
- (B) Hipersegmentação de neutrófilos.
- (C) Macrocitose e neutropenia.
- (D) Trombocitopenia.

QUESTÃO 23

Em relação às principais características de Síndrome de produção inapropriada de hormônio antidiurético (SIHAD), **NÃO** se inclui:

- (A) Função normal de tireóide e supra renal.
- (B) Hiperuricemia.
- (C) Hiponatremia.
- (D) Nível sérico de creatinina normal ou reduzido.

QUESTÃO 24

Sobre Embolia Pulmonar, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) A ausência de hemoptise é evidência contra o diagnóstico de embolia pulmonar.
- (B) Febre e arritmias podem aparecer durante evolução do paciente.
- (C) Os sintomas mais comuns são dispneia e dor torácica.
- (D) Taquipneia é o sinal mais comum.

QUESTÃO 25

São causas de Hiperpotassemia, **EXCETO**:

- (A) Alcalose metabólica.
- (B) Inibidores de ECA (Enzima conversora de Angiotensina).
- (C) Insuficiência renal avançada.
- (D) Intoxicação por digoxina.

QUESTÃO 26

Qual o procedimento **principal** na recuperação da parada cardiorrespiratória?

- (A) Cardioversão elétrica.
- (B) Compressão torácica.
- (C) Drogas vasoativas.
- (D) Manutenção de vias aéreas prévias.

QUESTÃO 27

Em caso de uso de drogas no tratamento da parada cardiorrespiratória, qual droga **NÃO** é de uso protocolar?

- (A) Adrenalina.
- (B) Amiodarona.
- (C) Atropina.
- (D) Vasopressina.

QUESTÃO 28

Sobre o tratamento da asma, é correto o que se afirma, **EXCETO** em:

- (A) A rouquidão e candidíase oral são efeitos colaterais com o uso de corticoides inalados.
- (B) O salbutamol e o formoterol exibem um início de ação rápida no controle da asma.
- (C) Os agonistas B2- adrenérgicos são usados no tratamento da asma.
- (D) Os corticoides inalados são o tratamento de controle mais efetivo para a asma.

QUESTÃO 29

Qual antimicrobiano **NÃO** tem ação anaerobicida?

- (A) Clindamicina.
- (B) Gentamicina.
- (C) Meropenem.
- (D) Metronidazol.

QUESTÃO 30

Em relação à profilaxia antimicrobiana cirúrgica, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Ceftriaxona é a droga de preferência.
- (B) Deve ser mantida durante todo o período de internação.
- (C) Deve ser iniciada entre 30 e 60 minutos antes do procedimento, na maioria das cirurgias.
- (D) Em alguns procedimentos, o antimicrobiano deve ser mantido após a alta hospitalar.

QUESTÃO 31

Qual a opção para tratamento do *Stafilococcus aureus* resistente a Oxacilina?

- (A) Azitromicina.
- (B) Cefepime.
- (C) Polimixina B.
- (D) Vancomicina.

QUESTÃO 32

Qual droga tem **amplo** espectro para Gram positivos, Gram negativos e anaeróbios?

- (A) Ampicilina.
- (B) Clindamicina.
- (C) Piperacilina/tazobactam.
- (D) Polimixina B.

QUESTÃO 33

Quais exames confirmam o diagnóstico de hepatite B aguda?

- (A) TGO / TGP / ANTI- HBe.
- (B) TGO / TGP / ANTI- HBs.
- (C) TGO / TGP / HBeAg.
- (D) TGO / TGP / HBsAg / ANTI-HBc IGm.

QUESTÃO 34

Qual a indicação para **início** de tratamento para o portador de HIV?

- (A) Carga viral maior que 100.000 cópias.
- (B) CD4 inferior a 500.
- (C) Logo que se confirma a infecção.
- (D) Quando apresentar sintomas.

QUESTÃO 35

São patologias relacionadas com alteração do sensório no idoso:

- I. Distúrbio hidroeletrólítico
- II. Infecções
- III. Hematoma subdural crônico

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.

QUESTÃO 36

Qual droga **NÃO** está relacionada ao tratamento da demência no idoso?

- (A) Haloperidol.
- (B) Levotiroxina.
- (C) Quetiapina.
- (D) Risperidona.

QUESTÃO 37

São situações que determinam o uso racional de antimicrobianos, **EXCETO**:

- (A) Avaliação do sítio de infecção e flora envolvida.
- (B) Dose, intervalos e tempo de tratamento.
- (C) Em casos de infecções hospitalares, a análise da microbiota do hospital.
- (D) Uso preferencial de antimicrobianos de largo espectro.

QUESTÃO 38

O método propedêutico **NÃO** invadido para **melhor** diagnóstico dos hemangiomas hepáticos é:

- (A) Angio-RM.
- (B) Colangio-RM.
- (C) Tomografia computadorizada do abdômen.
- (D) Ultrassom abdominal.

QUESTÃO 39

Em caso de gestante com IgM positivo para toxoplasmose, o exame **imprescindível** para avaliar o tratamento é:

- (A) Avidéz IgG toxoplasmose.
- (B) IgM e IgG positivos.
- (C) PCR quantitativo.
- (D) Titulação alta do IgM.

QUESTÃO 40

Em caso de paciente apresentar VDRL positivo, título alto, sem tratamento prévio, a conduta **CORRETA** é:

- (A) Acompanhar a titulação e tratar em caso de aumento.
- (B) Penicilina benzatina 1.200.000 unidades.
- (C) Penicilina benzatina 2.400.000 unidades a cada semana por 3 semanas.
- (D) Penicilina benzatina 2.400.000 unidades.

QUESTÃO 41

As seguintes alterações podem estar presentes nos pacientes diabéticos de longa evolução, **EXCETO**:

- (A) Insuficiência suprarrenal.
- (B) Microalbuminúria.
- (C) Microangiopatia.
- (D) Retinopatia.

QUESTÃO 42

Na hipertensão arterial secundária ao hiperaldosteronismo primário, podemos encontrar as seguintes condições, **EXCETO**:

- (A) Adenoma de suprarrenal.
- (B) Alcalose metabólica.
- (C) Hipocalemia.
- (D) Hiponatremia.

QUESTÃO 43

Em relação à alcalose metabólica, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) $\text{HCO}_3^- > 26,0$
- (B) $\text{pH} < 7.45$
- (C) Pode ser causada por excesso de diuréticos.
- (D) Pode ser consequência de ingestão excessiva de bicarbonato.

QUESTÃO 44

Pode causar Alcalose respiratória, **EXCETO**:

- (A) Ansiedade extrema.
- (B) Estimulantes respiratórios.
- (C) Hipoventilação.
- (D) Respostas a dor e febre.

QUESTÃO 45

Um antiparasitário polivalente é a

- (A) Espiramicina.
- (B) Levamisole.
- (C) Nitazoxanita.
- (D) Pirimetamina.

QUESTÃO 46

São manifestações **mais** frequentes na doença de Crohn, **EXCETO**:

- (A) Uveíte.
- (B) Obstipação intestinal.
- (C) Artralgias.
- (D) Aftas.

QUESTÃO 47

São causas de anemia megaloblástica, **EXCETO**:

- (A) Deficiência de Ácido Fólico.
- (B) Deficiência de B12.
- (C) Deficiência de fator intrínseco.
- (D) Deficiência de vitamina K.

QUESTÃO 48

Em relação à anemia ferropriva, analise as afirmações:

- I. Ferro sérico diminuído.
- II. Capacidade de ligação do ferro aumentada.
- III. Ferritina sérica diminuída.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.

QUESTÃO 49

São sinais e sintomas que caracterizam a Doença de Behcet, **EXCETO**:

- (A) Aftas orogenitais.
- (B) Icterícia.
- (C) Lesões cutâneas.
- (D) Meningite asséptica.

QUESTÃO 50

Em casos de Lupus Eritematoso sistêmico, **NÃO** é correto afirmar:

- (A) Pode cursar com lesões na pele, artralgia e inflamação das membranas.
- (B) Manifestações neuropsiquiátricas podem ocorrer.
- (C) Nefrite é uma das manifestações possíveis.
- (D) Ocorre igualmente entre homens e mulheres.

CONCURSO PÚBLICO

HOSPITAL MADRE TERESA

EDITAL 01/2013 - complementar

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	



Av. Francisco Sales, 540 - Floresta - 30150-220 - Belo Horizonte/MG
(31) 3248-7400 - www.fumarc.org.br / fumarcoconcursos@puccinas.br

Impressão: FUMARC GRÁFICA - (31) 3248-7400