

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crista da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Medicina do Trabalho

QUESTÃO 21

De acordo com a NR-17, Anexo I, podemos afirmar, com relação à organização do trabalho de operadores de *checkout*, que são medidas que podem ser adotadas pelas empresas, a seu critério, para adequar o ritmo de trabalho às características psicofisiológicas de cada operador:

- a) Operadores de *checkout* com características diferentes devem ser mantidos fixos em postos de trabalho adaptados às suas características.
- b) É tarefa do operador de *checkout* evitar fraudes ou roubo de mercadorias pelos clientes; para tanto, o trabalhador deve receber treinamentos periódicos que o preparem para esta atividade.
- c) São garantidas as saídas dos postos de trabalho, a qualquer momento da jornada, para que os operadores atendam às suas atividades fisiológicas, sem obrigatoriedade de comunicação prévia.
- d) A proibição ao empregador de promover, para efeitos de remuneração ou premiação de qualquer espécie, sistemas de avaliação do desempenho com base no número de mercadorias ou compras por operador.

QUESTÃO 22

Em relação às medidas de segurança e saúde ocupacional na mineração (NR 22), são medidas aplicáveis aos transportadores contínuos através de correia, **EXCETO**:

- a) É obrigatória a existência de dispositivos de desligamento ao longo de todos os trechos de transportadores contínuos, onde possa haver acessos rotineiro de trabalhadores.
- b) Só será permitida a transposição através de passarelas sem proteção especial quando realizada acima de transportadores contínuos.
- c) O trânsito por baixo de transportadores contínuos só será permitido em locais protegidos contra quedas de materiais.
- d) Os transportadores contínuos elevados devem ser dotados de dispositivos de proteção, onde houver risco de queda ou lançamento de materiais de forma não controlada.

QUESTÃO 23

Estão corretas as seguintes relações entre agentes químicos e indicadores biológicos para análise dos mesmos, **EXCETO**:

- a) Estireno - ácido mandélico e/ou ácido fenil-glioxílico.
- b) Nitrobenzeno - metahemoglobina.
- c) Xileno - ácido metil-hipúrico.
- d) Dissulfeto de carbono - carboxihemoglobina.

QUESTÃO 24

Estão corretas as seguintes relações entre riscos e exames complementares como parâmetros para monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos à saúde, **EXCETO**:

- a) Exposição a aerodispersóides fibrinogênicos - telerradiografia de tórax e espirometria.
- b) Exposição a aerodispersóides não-fibrinogênicos - telerradiografia de tórax e espirometria.
- c) Exposição ao benzeno - hemograma completo e ácido hipúrico.
- d) Exposição a hormônios sexuais femininos - realizar dosagem de testosterona total ou plasmática livre, LH e FSH, apenas nos trabalhadores do sexo masculino.

QUESTÃO 25

Podemos afirmar que se trata de um princípio e procedimento básico para a realização do exame audiométrico:

- a) O audiômetro deverá ser submetido a aferição acústica bianual.
- b) O audiômetro deverá ser submetido a calibração acústica, sempre que a aferição acústica indicar alteração, e, obrigatoriamente a cada 3 anos.
- c) Aferição biológica é recomendada sempre que houver alteração no resultado da aferição acústica.
- d) Poderá ser aceito para fins demissionais o exame audiométrico realizado até 135 (cento e trinta e cinco) dias retroativos em relação à data do exame médico demissional de trabalhador de empresa classificada em grau de risco 1 ou 2.

QUESTÃO 26

Com relação à interpretação dos resultados dos exames audiométricos com finalidade de prevenção, podemos considerar como corretas as seguintes condutas, **EXCETO**:

- a) São consideradas sugestivas de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas, nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentem limiares auditivos acima de 25 dB (NA).
- b) São considerados como sugestivos de desencadeamento de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que o exame audiométrico de referência mostrar em todas as frequências testadas, limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB (NA) e em exame seqüencial, observar-se uma piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz igual ou maior que 15 dB (NA).
- c) São considerados como sugestivos de desencadeamento de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que o exame audiométrico de referência mostrar em todas as frequências testadas, limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB (NA) e, em exame seqüencial, observar-se que a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz igualar ou ultrapassar 20 dB (NA).
- d) São considerados como sugestivos de agravamento da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos já confirmados em exame audiométrico e, em exame seqüencial, observar-se piora em uma frequência isolada igual ou maior que 10 dB (NA).

QUESTÃO 27

De acordo com o artigo 21 da Lei 8.213/1991, equiparam-se a acidente de trabalho, **EXCETO**:

- a) O acidente sofrido pelos segurado no local e em horário de trabalho em consequência de ato de sabotagem praticado por terceiro ou companheiro de trabalho.
- b) Os casos de doença endêmica adquirida pelo segurado habitante e residente na região em que ela se desenvolva, quando sua atividade laborativa estiver sendo exercida nesta mesma região.
- c) O acidente sofrido pelos segurado no local e em horário de trabalho em consequência de ato de pessoa privada do uso da razão.
- d) O acidente sofrido pelos segurado no local e em horário de trabalho em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

QUESTÃO 28

A perda auditiva por exposição a níveis elevados de pressão sonora é, por definição, uma perda auditiva neurossensorial. O diagnóstico diferencial, para com outras causas de perda auditiva neurossensorial, deve ser realizado.

Indique qual causa de perda auditiva neurossensorial não se constitui num diagnóstico diferencial:

- a) Exposição a ruído de impacto.
- b) Ototóxica.
- c) Metabólicas e hormonais.
- d) Doença de Menière.

QUESTÃO 29

Episódios depressivos são também associados à exposição ocupacional às seguintes substâncias químicas tóxicas, **EXCETO**:

- a) Diclorometano.
- b) Brometo de metila.
- c) Sulfeto de carbono.
- d) Tolueno.

QUESTÃO 30

Os seguintes agentes etiológicos e fatores de risco de natureza ocupacional devem ser considerados na investigação da etiologia de leucemia em trabalhadores:

- a) Mercúrio inorgânico.
- b) Benzeno.
- c) Óxido de etileno.
- d) Agrotóxicos clorados.

QUESTÃO 31

Indique qual das afirmativas a seguir não está relacionada às espécies denexo causal nas doenças do trabalho:

- a) A lista B do anexo 2 do regulamento da Previdência Social arrola diversas doenças relacionadas com o trabalho em que onexo causal gera apenas presunção relativa da natureza ocupacional do agravo.
- b) A instituição do nexotécnico epidemiológico previdenciário (NTEP) não desobriga a empresa da emissão de CAT.
- c) No caso das doenças relacionadas na lista B do anexo 2 do regulamento da Previdência Social, a empresa pode demonstrar a ausência de nexo causal e o trabalho.
- d) A inexistência de nexotécnico epidemiológico elide o nexo causal entre o trabalho e o agravo.

QUESTÃO 32

Podemos afirmar, com relação à pneumoconiose devida às poeiras inorgânicas:

- a) Pneumoconioses por poeiras mistas apresentam função pulmonar normal, mesmo nas fases avançadas da doença.
- b) Berilose é uma doença causada pela exposição ao Berílio e pode se manifestar de forma aguda ou crônica até de 10 a 15 anos depois de cessada a exposição.
- c) Estanhose não provoca sintomas e apresenta imagens radiológicas pela sua radiopacidade.
- d) Siderose, na forma pura, é assintomática, mas freqüentemente se associa à silicose.

QUESTÃO 33

Com relação às radiolesões localizadas na pele, podemos afirmar:

- a) Assemelham-se às queimaduras convencionais pelo fato de se evidenciarem imediatamente após a exposição ao agente causal.
- b) Na fase inicial apresentam eritema acompanhado por crises de vasculite, indicando importantes transtornos circulatórios e que têm por substrato uma endarterite obliterativa.
- c) Na fase tardia, poderão ocorrer alterações tróficas e atrofia das unhas.
- d) Na fase inicial, após radiolesões graves, poderá ocorrer fibrose radioinduzida, que pode causar seqüelas como a “mão em garra”.

QUESTÃO 34

São critérios de recusa para execução de tarefas com utilização de radiações eletromagnéticas não ionizantes (laser), **EXCETO**:

- a) Os monoftalmos.
- b) Todos os portadores de lesões que afetem os olhos, ainda que levemente.
- c) Os amblíopes.
- d) Os portadores de diabetes (sobretudo os insulino-dependentes).

QUESTÃO 35

São características que podem ser incluídas no que se denomina *resposta organizacional*, ações desenvolvidas pelas empresas para fazer face aos problemas de segurança do trabalho identificados, de acordo com Pransky, Snyder e Himmelstein (1996):

- a) Promover consistência entre ações e metas estabelecidas pela organização.
- b) Possuir um forte líder de projeto.
- c) Envolver efetivamente os trabalhadores, incentivando-os por meio de treinamentos dos grupos em habilidades para resolução de problemas.
- d) Estabelecer metas organizacionais definidas, evitando-se ações que impliquem alterações de decisões estratégicas.

QUESTÃO 36

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) utiliza três indicadores para medir e comparar a ocorrência de acidentes de trabalho entre diferentes setores de atividade econômica de um país. Indique entre as alternativas abaixo, a alternativa que não corresponde a estes indicadores:

- a) Relação entre número de acidentes x tipo de atividade desenvolvida.
- b) Índice de frequência.
- c) Índice de gravidade.
- d) Taxa de incidência.

QUESTÃO 37

Estão entre os índices de absenteísmo sugeridos pela ICOH, **EXCETO**:

- a) Índice de frequência (licenças médicas).
- b) Índice de duração (dias).
- c) Índice de prevalência momentânea.
- d) Média de licença por pessoa.

QUESTÃO 38

A promoção de saúde no trabalho pode ser caracterizada como uma estratégia para pessoas saudáveis em empresas saudáveis. Tem o propósito de prevenir a doença e desenvolver o potencial de saúde e bem-estar dos trabalhadores no local de trabalho. Não faz parte das ações sugeridas para se alcançar este propósito:

- a) A prevenção da morbidade geral da população.
- b) A avaliação de fatores de risco de natureza psicossocial e os problemas de saúde mental e de bem-estar da população trabalhadora.
- c) O encaminhamento de trabalhadores portadores de condições mórbidas associadas a riscos não diretamente relacionados com o trabalho para tratamento adequado e orientações sobre hábitos e comportamentos saudáveis antes de sua admissão em atividades de risco.
- d) A avaliação dos custos econômicos e sociais da incapacidade para o trabalho (temporária, de longa duração e permanentemente).

QUESTÃO 39

Entre os níveis de graduação quantitativa de exposição ocupacional ao ruído, tomando-se como critério a exposição média obtida através de audiosimetrias, podemos afirmar como correto:

- a) Nível I – exposição < 85 dB(A) – exposição desprezível ou insignificante.
- b) Nível II – exposição entre 80 a 85 dB(A) – exposição leve.
- c) Nível III – exposição entre 85 a 95 dB(A) – exposição moderada.
- d) Nível IV – exposição > 95 dB(A) – exposição elevada.

QUESTÃO 40

Podemos afirmar acerca das pneumonites por hipossensibilidade, **EXCETO**:

- a) São descritos como um espectro de distúrbios pulmonares predominantemente intersticiais e imunologicamente mediados, causados pela exposição intensa e quase sempre prolongada a poeiras inorgânicas e antígenos ocupacionais inalados.
- b) Com mais frequência, a hipersensibilidade resulta da inalação de poeiras orgânicas contendo antígenos constituídos de esporos de bactérias termofílicas, fungos verdadeiros, proteínas animais ou produtos animais.
- c) As evidências de estudos experimentais e em seres humanos sugerem fortemente uma patogenia por imunocomplexos do tipo III para as lesões iniciais.
- d) A hipersensibilidade tipo IV ocorre quando linfócitos-T sensibilizados induzem resposta mediada por célula, após um período de latência.

QUESTÃO 41

Algumas doenças e condições podem ser consideradas contra-indicações para o trabalho com radiações ionizantes. Dentre as alternativas abaixo, qual delas não se caracteriza como contra-indicação específica:

- a) Existência ou antecedentes de doenças malignas.
- b) Anomalias faciais ou doenças do aparelho respiratório e que impeçam o uso de máscaras e filtros respiratórios.
- c) Insuficiência hepática, respiratória ou renal.
- d) Usuários de marca-passos cardíacos.

QUESTÃO 42

O exame neuropsicológico pode fornecer importantes subsídios para a identificação de déficits secundários à exposição de agentes químicos potencialmente neurotóxicos. São vantagens do exame neuropsicológico na investigação da neurotoxicidade, **EXCETO**:

- a) Segurança (não envolve riscos).
- b) Objetividade e possibilidade de replicação.
- c) Precocidade (permite identificar déficits sutis, antes de ocorrer envolvimento maior do sistema nervoso central).
- d) Os resultados possuem validade ecológica (em todos os casos representam déficits reais na vida cotidiana do indivíduo).

QUESTÃO 43

Os óleos de corte são substâncias químicas largamente utilizadas nas indústrias metalúrgicas, com a finalidade de se obter melhor rendimento e acabamento do material em operações de corte e usinagem de metais. Qual das alterações dermatológicas abaixo **NÃO** se relaciona à exposição ocupacional ao óleo de corte?

- a) Dermatite irritativa de contato.
- b) Úlceras profundas de pele.
- c) Hipocromias ou vitiligo ocupacional.
- d) Câncer cutâneo.

QUESTÃO 44

O corpo humano deve trabalhar na vertical, e nessa posição ele encontra seu melhor ponto de equilíbrio, com baixo nível de tensão dos músculos em geral. Para fazer valer este princípio a seguinte medida deve ser aplicada no trabalho:

- a) Para trabalhos pesados – bancada na altura do púbis.
- b) Para trabalhos moderados – bancada na altura da linha mamilar.
- c) Para trabalhos leves – bancada na altura dos cotovelos.
- d) Para trabalhos de escrita – bancada da mesa na altura dos cotovelos.

QUESTÃO 45

Entre os agentes listados como capazes de produzir ceratoconjuntivite, estão:

- a) Arsênio e seus compostos arsenicais.
- b) Compostos organoclorados.
- c) Radiações ionizantes.
- d) Ácido sulfídrico em exposições muito altas.

QUESTÃO 46

De acordo com o Anexo Nº 14 – NR 15, fazem jus a insalubridade em grau médio:

- a) Trabalhadores em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros.
- b) Trabalhadores nas operações de desgaseificação, decantação e reparos de vasilhames não desgaseificados ou decantados.
- c) Trabalhadores que exercem sua função em cemitérios (exumação de corpos).
- d) Trabalhadores em contato com lixo urbano (coleta e industrialização).

QUESTÃO 47

Dentre as alternativas abaixo, sobre a monitorização a agentes químicos podemos afirmar:

- a) A coleta de material para avaliação à exposição ao estireno deve ser realizada no início da última jornada da semana.
- b) A coleta de material para avaliação à exposição ao xileno deve ser realizada no início da última jornada da semana.
- c) Para avaliação da exposição ao mercúrio inorgânico, recomenda-se iniciar a monitorização após 6 meses de exposição.
- d) Para avaliação da exposição ao chumbo inorgânico, recomenda-se iniciar a monitorização após 6 meses de exposição.

QUESTÃO 48

A gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados deve estabelecer as seguintes medidas técnicas de prevenção, **EXCETO**:

- a) Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas.
- b) Prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem.
- c) Implementar dispositivos que possibilitem a ventilação com oxigênio puro.
- d) Utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência.

QUESTÃO 49

São condições que podem provocar interferência endócrina por fatores não primariamente químicos:

- a) Trabalho em grandes altitudes.
- b) Campo eletromagnético.
- c) Trabalho em temperaturas extremas.
- d) Trabalho em turnos.

QUESTÃO 50

O lavado broncoalveolar tem sido utilizado em doenças pulmonares ocupacionais para as seguintes finalidades, **EXCETO**:

- a) Diagnóstico de exposição.
- b) Diagnóstico do tipo de alveolite subjacente.
- c) Estudos experimentais e clínicos sobre a patogênese da exposição a arrossóis.
- d) Seguimento do paciente após afastamento da exposição suspeita para determinação da sua capacidade de retornar ao trabalho.

QUESTÃO 51

Destacam-se entre os agentes capazes de provocar hipertensão arterial relacionada ao trabalho:

- a) Exposição a ruído.
- b) Excesso de autonomia na organização do trabalho gerando insegurança em tomadas de decisões.
- c) Avaliação do desempenho e promoção.
- d) Horário irregular, trabalho em turnos e noturno.

QUESTÃO 52

Estão entre as principais causas de laringite por inalação, **EXCETO**:

- a) Fumaças.
- b) Poeiras.
- c) Gases.
- d) Vapores quentes.

QUESTÃO 53

É diretriz disposta na NR -17 que trata de Ergonomia:

- a) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 16 anos e maior de quatorze anos.
- b) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição em pé (vertical), o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição.
- c) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde ou segurança.
- d) Para atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, o nível de ruído aceitável no ambiente de trabalho, para efeito de conforto acústico, será de até 70 dB (A) e a curva de avaliação de ruído (NC) não poderá ultrapassar o valor de 80 dB.

QUESTÃO 54

No controle biológico da exposição a agentes químicos, são recomendadas as avaliações dos seguintes materiais biológicos, como indicadores, de acordo com a NR 7, **EXCETO**:

- a) agente químico: anilina; avaliar materiais biológicos: urina, sangue.
- b) agente químico: fenol; avaliar materiais biológicos: urina, sangue.
- c) agente químico: tolueno; avaliar materiais biológicos: urina.
- d) agente químico: arsênico; avaliar materiais biológicos: urina.

QUESTÃO 55

Em obediência à NR-17, Anexo II (Trabalho em Telemarketing), deverá ser cumpridas a seguintes determinação:

- a) o monitor de vídeo e o teclado deverão estar apoiados em superfícies com mecanismos de regulação independentes.
- b) o índice de temperatura efetiva do ambiente de trabalho deverá estar entre 15° e 20° graus C.
- c) Devem ser evitadas as determinações legais que propiciem a “Síndrome do Edifício Doente”.
- d) É permitida ao empregador a exigência da observância do *script* ou roteiro de atendimento.

QUESTÃO 56

Com relação ao PCMSO (NR7), a afirmativa **CORRETA** é:

- a) As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador, ficam dispensadas de elaborar o Relatório Anual.
- b) Em nenhuma hipótese, poderá o médico coordenador do PCMSO ser dispensado de possuir especialização em medicina do trabalho.
- c) Pela sua importância, recomenda-se que sejam colocados riscos genéricos no Atestado de Saúde Ocupacional, tais como: estresse, risco de choque elétrico para eletricitas, etc.
- d) O hipertenso poderá trabalhar em temperaturas elevadas, desde que sua patologia hipertensiva esteja sob controle, e que ele seja submetido a avaliações médicas regulares.

QUESTÃO 57

São condutas preconizadas para a investigação e controle de hepatotoxicidade ocupacional, **EXCETO**:

- a) Se no ambiente de trabalho for observada a presença de substâncias potencialmente hepatotóxicas, o médico responsável pelo atendimento ao trabalhador exposto deve procurar estar permanentemente atualizado sobre os efeitos tóxicos da substância, conhecer a história do uso de doenças hepáticas prévias e do uso de drogas hepatotóxicas.
- b) O exame admissional e os exames periódicos devem incluir dosagens de transaminases.
- c) Se forem mantidas as condições de exposição a substâncias potencial e/ou sabidamente hepatotóxicas e o exame periódico estiver alterado, o funcionário deverá ser afastado da função, dosagens de transaminases devem ser repetidas após 2 (duas) semanas, realizando-se diagnóstico diferencial com outras condições.
- d) Se após duas semanas as avaliações permanecerem anormais, deve-se manter o afastamento da função e repetir dosagens de transaminases a cada 3 meses, até se completar um ano.

QUESTÃO 58

Com relação ao trabalho em turnos, **NÃO** podemos afirmar:

- a) A organização do trabalho em turnos, noturnos ou rotativos, tem causado uma série de distúrbios na vida dos trabalhadores, quer sejam de ordem física, quer psíquica e social.
- b) A Constituição Brasileira de 1988 refletiu a importância do assunto sobre a saúde dos trabalhadores, estabelecendo a jornada de seis horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento (TTRI).
- c) A revisão da literatura permite presumir uma relação causal entre o aumento da prevalência de doença cardiovascular e o trabalho em turnos.
- d) Níveis séricos elevados de noradrenalina foram constatados em trabalhadores de turnos.

QUESTÃO 59

De acordo com o Anexo 3 da NR 15, está **CORRETA** a seguinte relação entre exposição a agente químico e grau de insalubridade decorrente de inspeção no local de trabalho:

- a) Empalhamento de animais à base de compostos de arsênico - insalubridade em grau máximo.
- b) Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo - insalubridade em grau máximo.
- c) Emprego de defensivos organofosforados - insalubridade em grau médio.
- d) Fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio - insalubridade em grau médio.

QUESTÃO 60

Com relação à capacitação dos trabalhadores em telemarketing (NR 17 - Anexo II), está **INCORRETO** afirmar:

- a) É recomendável a distribuição de material didático impresso com o conteúdo apresentado.
- b) A capacitação deve envolver, também, obrigatoriamente os trabalhadores temporários.
- c) A capacitação deve ter duração de 4 (quatro) horas na admissão e reciclagem a cada 6 (seis) meses, independentemente de campanhas educativas que sejam promovidas pelos empregadores.
- d) Todos os treinamentos de capacitação devem ser realizados durante a jornada de trabalho.

QUESTÃO 61

De acordo com a NR-15 e seus anexos, está **INCORRETO** afirmar:

- a) São radiações não ionizantes as microondas, ultravioletas e laser.
- b) As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão consideradas insalubres. A insalubridade nestes casos será de grau médio.
- c) O risco de umidade será reconhecido quando relacionado às atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, não sendo consideradas insalubres.
- d) Cabe ao empregador, após o término de contrato de trabalho envolvendo exposição ao asbesto, manter disponível a realização de exames médicos de controle dos trabalhadores durante 30 anos.

QUESTÃO 62

Com relação à PAIR relacionada ao trabalho, estão corretas as afirmativas abaixo, **EXCETO**:

- a) A PAIR é sempre neurossensorial, em razão do dano causado às células do órgão de Corti.
- b) Uma vez instalada, a PAIR é irreversível e quase sempre similar bilateralmente.
- c) Tratando-se de uma patologia coclear, o portador de PAIR pode apresentar intolerância a sons intensos e zumbidos, além de ter comprometida a inteligibilidade da fala, em prejuízo do processo de comunicação.
- d) A PAIR torna a orelha mais sensível a futuras exposições a ruídos intensos. À medida que os limiares auditivos aumentam, a progressão da perda torna-se mais rápida.

QUESTÃO 63

São critérios diagnósticos para síndrome da fadiga relacionada ao trabalho, **EXCETO**:

- a) Queixas persistentes e angustiantes de fadiga aumentada após esforço mental.
- b) Presença de transtorno de ansiedade generalizada.
- c) O paciente é incapaz de se recuperar por meio de descanso, relaxamento ou entretenimento.
- d) Duração do transtorno de pelo menos três meses.

QUESTÃO 64

O controle médico de trabalhadores expostos a radiações eletromagnéticas deverá ser feito pelo menos semestralmente e deverá abranger os seguintes exames especializados, **EXCETO**:

- a) Exame de vista, especialmente de retina.
- b) Eletroencefalograma.
- c) Dosagem de albumina na urina.
- d) Eletroforese de proteínas.

QUESTÃO 65

São características da fotossensibilização provocadas pela radiação ultravioleta, **EXCETO**:

- a) Podem ocorrer mesmo em níveis de exposição inferiores àqueles capazes de produzir queimaduras.
- b) Tempo de latência maior do que no caso das queimaduras, de 12 a 24 horas (entre a exposição e o aparecimento dos sintomas).
- c) Pode ocorrer em qualquer pessoa exposta, independente da sensibilidade individual.
- d) Há história de ingestão prévia de medicamentos (fotolábeis) ou exposição a produtos químicos (fotossensibilizantes).

QUESTÃO 66

Com relação à organização do trabalho, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) O controle do ou sobre o próprio trabalho está aumentando, embora 1/3 dos trabalhadores ainda relate pouco ou nenhum controle do trabalho.
- b) A atividade principal está cada vez mais focada no cliente (*client-driven*) e orientada pela tecnologia da informação.
- c) Os trabalhadores temporários (contratados por empresas terceirizadas) relatam situações de trabalho mais fáceis do que os trabalhadores fixos (com menos controle sobre os processos).
- d) A discriminação de gênero continua significativa, e contra o gênero feminino.

QUESTÃO 67

São indicadores Pós-perda de Segurança e Saúde no Trabalho, referentes à morbidade com absenteísmo de longo prazo, **EXCETO**:

- a) Proporção de exames de retorno ao trabalho realizados por ano.
- b) Índice de frequência de acidentes de trabalho.
- c) Índice de custo de acidentes de trabalho.
- d) Índice de custo de doenças do trabalho.

QUESTÃO 68

São atribuições da CIPA, de acordo com a NR-5, **EXCETO**:

- a) Requisitar à empresa cópias das CAT emitidas.
- b) Determinar a paralisação de máquina ou setor onde se considere haver risco grave e iminente à saúde e segurança dos trabalhadores.
- c) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas.
- d) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e do PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores.

QUESTÃO 69

O Plano de Emergência e Combate a Incêndio e Explosão deve conter:

- a) Detalhamento das edificações de forma isolada.
- b) Descrição dos equipamentos de segurança contra incêndios.
- c) População fixa e flutuante do local.
- d) Croqui dos equipamentos de segurança contra incêndio instalados.

QUESTÃO 70

Em obediência ao preconizado na NR 17, com relação às pausas no trabalho:

- a) As pausas deverão ser concedidas fora do posto de trabalho.
- b) As pausas deverão ser concedidas em 04 (quatro) períodos de 10 (dez) minutos contínuos.
- c) As pausas deverão ser concedidas após os primeiros e antes dos últimos 60 (sessenta) minutos de trabalho em atividades de tele-atendimento / telemarketing.
- d) As pausas para descanso devem ser consignadas em registro impresso ou eletrônico.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.